

Dez^zcansar[®]

DIFENHIDRAMINA HCl

inductor del sueño

- Tabletas
- Jarabe

CONOCIENDO Dez^zcansar[®]

Dez^zcansar[®] contiene como ingrediente activo Difenhidramina clorhidrato, el cual es un inductor del sueño que no produce hábito, ayuda a tener un inicio de sueño natural y sin sedación al despertar.

QUÉ CONTIENE Dez^zcansar[®]

Dez^zcansar[®] tabletas

Cada tableta contiene:

Difenhidramina HCl 50 mg

Excipientes c.s.

Dez^zcansar[®] jarabe

Cada 15 mL de jarabe contienen:

Difenhidramina HCl 25 mg

Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO Dez^zcansar[®]

Se indica en casos de insomnio, ya que induce al sueño en poco tiempo después de su administración, sin producir hábito o efectos secundarios que motiven su discontinuación.

CÓMO SE PRESENTA Dez^zcansar[®]

Dez^zcansar[®] tabletas se presenta en dispensador de 100 tabletas contenidas dentro de burbujas individuales de blister, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

Dez^zcansar[®] jarabe se presenta en caja que incluye el envase conteniendo 240 mL de jarabe con vasito dosificador y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

Dez^zcansar[®] tabletas

Adultos y niños mayores de 12 años: tomar 1 tableta (50 mg) antes de acostarse. No tomar más de esta dosificación en 24 hrs.

Dez^zcansar[®] jarabe

Adultos y niños mayores de 12 años: tomar 30 mL (50 mg) antes de acostarse. No tomar más de esta dosificación en 24 hrs.

ANTES DE USAR Dez^zcansar[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- No utilizar en los siguientes casos: Hipersensibilidad al ingrediente activo, problemas de asma, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, glaucoma, dificultad para orinar por crecimiento de la próstata, cardiopatías, niños menores de 12 años, embarazo y lactancia.
- Evitar administrar simultáneamente con sedantes, tranquilizantes y otros inductores del sueño, bebidas alcohólicas u otras drogas que produzcan somnolencia.
- Precaución en pacientes que operen maquinaria o que manejen vehículos automotores.

USO ADECUADO DE Dez^zcansar[®]

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo.
- Si después de 2 semanas de tratamiento los síntomas persisten, consulte a su médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco.

VENTA LIBRE

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
Fabricamos Salud



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com