
dolo-tetravit® PLUS

Doble Terapia

DICLOFENACO
VITAMINAS NEUROTROPAS

para dolores musculoesqueléticos y de
origen nervioso

Solución inyectable + Tabletas recubiertas

CONOCIENDO dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia
dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia es un medicamento que combina dos importantes clases de principios activos, que resultan útiles en aquellos casos en los que se combina un espasmo o dolor muscular con una inflamación del nervio. Por un lado Diclofenaco, que actúa combatiendo las inflamaciones y aliviando el dolor, y por otro las Vitaminas neurotropas (Vitamina B1, B6 y B12), las cuales actúan en las diferentes afecciones neurológicas (es decir del sistema nervioso) como las neuralgias, neuritis, ciática, lumbago, neuritis diabética, estrés, alcoholismo, etc. Esta acción la llevan a cabo actuando a nivel de la capa de mielina que recubre a los nervios, corrigiendo la irritación presente en el nervio y de esta manera aliviando el dolor. Es importante destacar la presencia de la Vitamina B12 (Hidroxocobalamina HCl), la cual tiene la ventaja de depositarse en el organismo permitiendo que la acción dure varios días, con lo cual se garantiza un aporte de Vitamina B12 constante sin perder su nivel de acción.

QUÉ CONTIENE dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia

Cada tableta recubierta contiene:

Diclofenaco potásico	50 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	1,000 mcg
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato)	50 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	50 mg
Excipientes c.s.	

Cada ampolla No.1 de 2 mL contiene:

Diclofenaco sódico	75 mg
Vehículo c.s.	

Cada ampolla No. 2 de 1 mL contiene:

Vitamina B12 (Cianocobalamina)	4,000 mcg
Vitamina B12 (Hidroxocobalamina HCl)	1,000 mcg
Vitamina B1 (Tiamina HCl)	100 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	100 mg
Vehículo c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia

dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia está indicado para el tratamiento inicial de mantenimiento, de los siguientes procesos:

- Neuritis (inflamación de los nervios) como ciática.
- Neuralgias (dolores de nervios).
- Lumbago (dolor en la región lumbar).
- Artrosis (degeneración de las articulaciones).
- Espondilitis anquilosante (enfermedad reumática deformante de la columna).
- Coadyuvante en el tratamiento del ataque agudo de gota (enfermedad producida por depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones).
- Reumatismo (inflamación de los músculos, ligamentos y tendones).

CÓMO SE PRESENTA dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia

dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia se presenta en caja conteniendo 2 tabletas recubiertas dentro de burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta; Una ampolla No. 1 y una ampolla No. 2, una jeringa descartable, una toallita con alcohol, el presente inserto y un instructivo de uso.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis puede ser diferente para cada caso. Siga las instrucciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Administrar por vía intramuscular (intraglútea), 1 dosis de dos ampollas (No.1 mezclada con No. 2) cada 24 horas por dos días o según indicación del médico.

Para un alivio prolongado del dolor, 8 horas después de la administración de la inyección, se recomienda continuar con el tratamiento oral, administrando 1 tableta recubierta de **dolo-tetravit®** cada 8 horas.

**ANTES DE USAR dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia
LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES
PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO**

- Alergia: Infórmele a su médico si usted padece de alergia a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- Si usted está utilizando otros medicamentos infórmele a su médico antes de utilizar **dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia**, en especial si usted está tomando digoxina, litio, diuréticos, antihipertensivos, anticoagulantes, glucocorticoides, metotrexato, ácido acetil salicílico y L-dopa.
- Infórmele a su médico si usted padece de enfermedades pépticas, colitis ulcerativa y alteraciones cardíacas, renales o sanguíneas.
- No administrar **dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia** durante el embarazo o lactancia.
- No administrar **dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia** en niños menores de 12 años.

EFFECTOS ADVERSOS

Como todo medicamento, **dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia**, podría producir ocasionalmente efectos adversos como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, insomnio, picazón del cuerpo. Después de la inyección intramuscular se pueden dar reacciones locales. Si cualquiera de éstos u otros síntomas no esperados se presentan, consulte a su médico.

RECOMENDACIONES

En tratamientos prolongados con Diclofenaco realizar pruebas hepáticas como transaminasas.

**USO ADECUADO DE dolo-tetravit® PLUS Doble
Terapia**

Antes de usar **dolo-tetravit® PLUS Doble Terapia** lea las instrucciones incluidas en el instructivo de uso que se adjunta.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



0110621

COD. 53029



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com