

kolchivan[®]

COLCHICINA

antigotoso

Tabletas

CONOCIENDO kolchivan[®]

kolchivan[®] tabletas es un medicamento que contiene como principio activo Colchicina, la cual es usado para el tratamiento de los ataques de gota (también conocida como gota artrítica). Las personas que padecen de gota producen mucho ácido úrico, por lo que se les acumula en la sangre y en las articulaciones. Un ataque de gota ocurre cuando el ácido úrico causa inflamación (dolor, enrojecimiento, hinchazón y calor) en una articulación. La Colchicina no sustituye a otros medicamentos para reducir la cantidad de ácido úrico en el cuerpo, sino que previene y alivia los ataques de gota, reduciendo la inflamación y generando un alivio casi inmediato con las primeras dosis.

kolchivan[®] tabletas puede ser utilizado de dos formas:

1. Tomando pequeñas dosis de Colchicina regularmente durante un largo periodo de tiempo (meses o años) para prevenir ataques agudos de gota.
2. Tomando grandes dosis de Colchicina durante un corto período de tiempo (varias horas) para aliviar un ataque de gota agudo una vez que se ha producido.

La posibilidad de efectos adversos es mucho menor con el primer tipo de tratamiento (preventivo).

kolchivan[®] tabletas puede ser usado también para otras afecciones según indicación de su médico.

QUÉ CONTIENE kolchivan[®]

Cada tableta contiene:
Colchicina 0.50 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kolchivan[®]

kolchivan[®] tabletas está indicado para el tratamiento de:

- Gota (artritis gotosa).
- Como auxiliar en el tratamiento de cirrosis hepática.





CÓMO SE PRESENTA kolchivan[®]

kolchivan[®] tabletas se presenta en caja conteniendo 50 tabletas en blisteras, conteniendo cada una 10 tabletas en burbujas individuales de plástico que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosificación y duración del tratamiento depende del problema que presente el paciente, y de las indicaciones de su médico. La siguiente información incluye sólo los tratamientos promedio de Colchicina. Si la dosis que le indicó su médico es diferente, no la cambie a menos que su médico lo autorice. El número de dosis que el paciente tome cada día, el tiempo entre las dosis y la duración del tratamiento dependerá de que tan a menudo se presentan los ataques de gota y de la prontitud de inicio del tratamiento para prevenir o aliviar el ataque. La cantidad de medicamento dependerá también de la forma en que el paciente reaccione a la misma.

ADULTOS		
Tratamiento preventivo	Inicialmente 1 tableta al día. *Si los ataques continúan, su médico puede indicarle incrementar la dosis a 1 tableta dos o tres veces al día por el tiempo que considere necesario.	
Tratamiento del ataque agudo de la gota	Iniciar con 2 tabletas. Continuar con 1 tableta cada 2 horas hasta que cese el dolor o se presenten cólicos, náuseas, vómito o diarrea; sin exceder en ningún caso de un total de 12 tabletas al día.	  Iniciales  Cada 2 horas

ANTES DE USAR kolchivan[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: no administrar en pacientes alérgicos a la Colchicina o a cualquier otro medicamento o comida.
- Embarazo o lactancia: no se recomienda la administración durante el embarazo o lactancia.
- Ancianos: la administración debe hacerse bajo estricta vigilancia médica, debido a que los ancianos son más sensibles a los efectos de la Colchicina y ésta puede permanecer durante más tiempo en su organismo, lo cual puede incrementar los efectos adversos.
- Informe a su médico en caso de padecer cualquier otro problema médico, especialmente: alcoholismo, trastornos estomacales e intestinales, problemas del corazón, trastornos del riñón o trastornos del hígado.
- Suspenda el tratamiento si se presentan los siguientes síntomas: diarrea, náusea, vómito o dolor de estómago. Si alguno de estos síntomas persisten después de 3 horas o más tiempo de haber suspendido el tratamiento, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE kolchivan[®]

- Inicie el tratamiento al aparecer los primeros síntomas del ataque para obtener mejores resultados.
- Finalice la toma de **kolchivan[®]** tan pronto como se presente el alivio del dolor o aparezca náusea, vómitos, dolor de estómago o diarrea.
- No tome más de 12 tabletas en un periodo de 24 horas.
- Después de finalizar el ataque agudo, no tome más Colchicina por lo menos durante 3 días.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omite la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- Si usted toma regularmente **kolchivan[®]** consulte a su médico periódicamente según él se lo indique.
- Evite ingerir bebidas alcohólicas mientras se encuentre en tratamiento con **kolchivan[®]**.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

