

principal®

FOSFOLÍPIDOS ESENCIALES Y
VITAMINAS HEPATOPROTECTORAS

protector hepático

- Tabletas recubiertas
- Polvo para suspensión oral

CONOCIENDO principal®

principal® es un producto que activa el metabolismo del hígado, ya que los Fosfolípidos incluidos en su fórmula son una réplica de la estructura química de los ya presentes en el organismo, por lo que son mejor captados por el hígado y a la vez mejor incorporados en sus membranas y organelos, para ser transmitidos a la bilis, la cual funciona como medio ideal de desintoxicación.

Los Fosfolípidos contenidos en **principal®** favorecen la movilización de las grasas neutras acumuladas por alteraciones en las células hepáticas, con lo que previenen el desarrollo de cambios grasos degenerativos. Las Vitaminas del complejo "B" además de su acción en la movilización de grasas a concentraciones óptimas, contribuyen a un buen número de importantes transformaciones metabólicas, con lo que se logra un mejor funcionamiento del hígado a la vez que se protege la célula hepática.

QUÉ CONTIENE principal®

principal® forte tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:

Fosfolípidos esenciales (principales)	300 mg
Vitamina B1 (Tiamina HCl)	6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	6 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	6 mcg
Nicotinamida	30 mg
Vitamina E	6 mg
Excipientes c.s.	
Contiene Tartrazina	

principal® polvo para suspensión oral

Cada 5 mL de suspensión preparada contienen:

Fosfolípidos esenciales (principales)	150 mg
Vitamina B1 (Tiamina HCl)	6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	6 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	6 mcg
Nicotinamida	30 mg
Vitamina E	6 mg
Vehículo c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO principal®

principal® está indicado en gran variedad de afecciones como lo son:

- Hepatitis aguda y crónica
- Cirrosis hepática
- Hígado graso
- Trastornos del hígado por: alimentos, alcohol, etc.

CÓMO SE PRESENTA principal®

principal® forte tabletas recubiertas se presenta en caja conteniendo 25 y 60 tabletas recubiertas, dentro de burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

principal® polvo para suspensión oral se presenta en caja que contiene un frasco con polvo y un frasco con agua purificada en cantidad apropiada para preparar 120 mL de suspensión oral. Incluye vasito dosificador, instructivo de uso, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.


La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Sigla las instrucciones que su médico le indique.

A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos: 2 tabletas recubiertas tres veces al día después de cada comida, durante tres meses.



Niños: 5 mL a 10 mL de suspensión preparada después de cada comida durante tres meses.



CONTRAINDICACIONES

principal® forte tabletas recubiertas contiene Tartrazina, no administrar a personas alérgicas a Tartrazina.

No administrar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

USO ADECUADO DE principal®

Para forma de preparación de la suspensión y administración, ver instructivo adjunto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• **Polvo antes de preparar la suspensión y tabletas recubiertas:** protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

• **Suspensión preparada:** después de preparada la suspensión, almacenarla a temperatura ambiente y utilizarla en un período no mayor de 30 días, al cabo de ese tiempo desechar el sobrante.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al

BPX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

