

principal® R

COMPLEJO DE SILIBINA CON FOSFATIDILCOLINA
FOSFOLÍPIDOS ESENCIALES Y VITAMINAS HEPATOPROTECTORAS

regenerador y protector hepático de última generación

- Tabletas recubiertas
- Polvo para suspensión oral

CONOCIENDO principal® R

Es un novedoso producto que contiene como principios activos el Complejo de Silibina con Fosfatidilcolina, Fosfolípidos esenciales y Vitaminas hepatoprotectoras.

La acción regeneradora de **principal® R** se produce debido a la Silibina, la cual es el componente de mayor actividad terapéutica de la Silimarina, que ha demostrado evidencia clínica de promover el crecimiento de nuevas células hepáticas. Además protege al hígado de varias formas, actuando como antioxidante, ayudando en la movilización de las grasas y evitando la entrada de sustancias tóxicas.

La eficacia de **principal® R** se debe a que haciendo uso de un sistema biotecnológico conocido como fitosoma, la Silibina se encuentra unida a la Fosfatidilcolina en forma de un complejo, el cual se comporta como un vehículo natural de la Silibina, que resulta ser la combinación ideal que permite incrementar hasta 10 veces su absorción normal, garantizando así sus efectos terapéuticos.

Los Fosfolípidos esenciales ofrecen protección ante el daño producido en el hígado, debido a su participación en el metabolismo de las grasas acumuladas dentro del mismo.

Las Vitaminas hepatoprotectoras estimulan la movilización de los depósitos de grasa y la bilis localizadas en las células hepáticas, con lo que contribuyen en el buen funcionamiento del hígado. La

vitamina E posee una potente acción antioxidante que protege a las células del hígado.

QUÉ CONTIENE principal® R

principal® R tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:

Complejo de Silibina con Fosfatidilcolina **160 mg** equivalente a:

Silibina	52.80 mg
Fosfatidilcolina	107.20 mg

Fosfolípidos esenciales 100.00 mg
equivalente a:

Fosfatidilcolina	22.00 mg
Otros fosfolípidos	78.00 mg

Vitaminas hepatoprotectoras

Tiamina HCl	6.00 mg
Riboflavina	6.00 mg
Piridoxina HCl	8.00 mg
Nicotinamida	16.00 mg
Cianocobalamina	8.00 mcg
Vitamina E	50.00 UI
Excipientes c.s.	

principal® R polvo para suspensión oral

Cada 5 mL de suspensión preparada contienen:

Complejo de Silibina con Fosfatidilcolina **80 mg** equivalente a:

Silibina	26.40 mg
Fosfatidilcolina	53.60 mg

Fosfolípidos esenciales 150.00 mg
equivalente a:

Fosfatidilcolina	33.00 mg
Otros fosfolípidos	117.00 mg

Vitaminas hepatoprotectoras

Tiamina HCl	6.00 mg
Riboflavina	6.00 mg
Piridoxina HCl	6.00 mg
Nicotinamida	16.00 mg
Cianocobalamina	8.00 mcg
Vitamina E	50.00 UI
Vehículo c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO **príncipeal® R**

príncipeal® R está indicado como regenerador y protector del hígado en diversas afecciones como:

- Hepatitis.
- Hígado graso.
- Cirrosis.
- Intoxicación por medicamentos y otras sustancias tóxicas.
- Pacientes bajo tratamiento con diversos medicamentos, con tratamiento quimioterapéutico, dieta desbalanceada y/o exceso de grasa.
- Otras enfermedades que puedan ocasionar daño al hígado.

CÓMO SE PRESENTA **príncipeal® R**

príncipeal® R tabletas recubiertas se presenta en caja de 25 y 40 tabletas recubiertas contenidas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.



príncipeal® R polvo para suspensión oral se presenta en caja conteniendo un envase con polvo y un envase con agua purificada en cantidad apropiada para preparar 120 mL de suspensión. Incluye un instructivo de uso, un vasito dosificador y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN



Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Siga las instrucciones que le de su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

príncipeal® R tabletas recubiertas

Dosis inicial	1 tableta recubierta tres veces al día, después de las comidas.	
Dosis de mantenimiento	1 tableta recubierta, dos veces al día.	

príncipeal® R polvo para suspensión oral

Dosis inicial	5 a 10 mL de suspensión oral preparada tres veces al día, después de las comidas.	
Dosis de mantenimiento	5 mL de suspensión oral preparada dos veces al día, después de las comidas.	

ANTES DE USAR **príncipeal® R** LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

Alergia: No administrar si usted es alérgico a los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.

USO ADECUADO DE **príncipeal® R**

Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- **Polvo antes de preparar la suspensión oral y tabletas recubiertas:** protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
- **Suspensión preparada:** almacenarla a temperatura ambiente, y utilizarla en un periodo no mayor de 30 días, al cabo de ese tiempo deseche el sobrante.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

