

# urikem<sup>®</sup>

## ALOPURINOL

### reductor de la síntesis del ácido úrico para el tratamiento de la gota

#### Tabletas

#### CONOCIENDO urikem<sup>®</sup>

**urikem<sup>®</sup> tabletas** es un medicamento que contiene como principio activo Alopurinol, que se utiliza para el tratamiento de la gota crónica, enfermedad causada por el exceso de ácido úrico en el cuerpo. El Alopurinol actúa disminuyendo la cantidad de ácido úrico que se produce en el organismo, previniendo así los ataques de gota. También es utilizado para tratar otras patologías que pueden ocurrir si hay demasiado ácido úrico presente en el cuerpo, como por ejemplo, ciertos problemas de riñón.

#### QUÉ CONTIENE urikem<sup>®</sup>

Cada tableta de **urikem<sup>®</sup>** contiene:  
Alopurinol 300 mg  
Excipientes c.s.

#### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO urikem<sup>®</sup>

**urikem<sup>®</sup> tabletas** está indicado en el tratamiento de:

- Artritis gotosa crónica.
- Hiperuricemia primaria (aumento del ácido úrico en sangre u orina, en donde se presentan depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones y en riñones).
- Hiperuricemia secundaria (provocada por tratamiento de radioterapia y quimioterapia).
- Lesiones del riñón causadas por cálculos renales debido al ácido úrico.

#### CÓMO SE PRESENTA urikem<sup>®</sup>

**urikem<sup>®</sup> tabletas** se presenta en caja conteniendo 20 ó 30 tabletas en burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

#### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

#### • Gota:

El tratamiento se inicia con media tableta diaria, aumentando la dosis hasta llegar a un máximo de 3 tabletas al día, hasta alcanzar los niveles normales de ácido úrico en sangre y en orina. Luego se continúa con 1 tableta al día como mantenimiento.

#### • Cálculos renales:

Administrar 1 tableta al día o media tableta cada 12 horas.

#### • Prevención o tratamiento de problemas que ocurren si ciertos tratamientos ajenos incrementan la cantidad de ácido úrico en la sangre:

Administrar 2 ó 3 tabletas al día, iniciando de 1 a 3 días antes de empezar dichos tratamientos.

#### ANTES DE USAR urikem<sup>®</sup> LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: Si padece de alergia al Alopurinol, o a cualquier otro medicamento o comida.
- No administrar durante el embarazo o la lactancia.
- Uso con otros medicamentos: si usted está utilizando otros medicamentos, especialmente azatioprina anticoagulantes o mercaptopurina.
- Si usted padece de otros problemas médicos, como desórdenes renales, hepáticos, cardíacos, diabetes o presión alta.

#### EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos **urikem<sup>®</sup> tabletas** puede producir efectos adversos como: erupciones cutáneas o picazón de la piel, náuseas y/o vómitos. En caso de que estos u otros efectos adversos se presenten, consulte con su médico.

#### USO ADECUADO DE urikem<sup>®</sup>

- Si el medicamento le provoca trastornos gástricos como náusea, indigestión, vómitos, diarrea o dolor de estómago, puede tomarlo después de las comidas. Si los trastornos continúan, consulte a su médico.
- Se recomienda tomar de 10 a 12 vasos de agua al día, mientras dure el tratamiento, a menos que su médico le indique otra cosa.
- No tomar más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro  
Departamento Médico en Guatemala

al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

