perivan plus®

E N Z I M Á T I C O

ENZIMAS DIGESTIVAS, MOSAPRIDA CITRATO Y DIMETILPOLISILOXANO

- ***Enzimático digestivo***
- ***Regulador de la motilidad gastrointestinal***
- ***Antiflatulento***

Tabletas con recubrimiento entérico

CONOCIENDO perivan plus® ENZIMÁTICO
perivan plus® ENZIMÁTICO tabletas con recubrimiento entérico es un medicamento multiacción que combina 3 componentes: la **Mosaprida citrato** como agente que ayuda a la motilidad gastrointestinal y tiene una acción aceleradora de la evacuación gástrica, mientras que la presencia de las **Enzimas digestivas**: proteasa, amilasa y lipasa, promueve la digestión eficaz de proteínas, glúcidos y lípidos respectivamente; y por último el **Dimetilpolisiloxano**, ayuda a la reducción del gas gastrointestinal por su propiedad de disminuir la tensión superficial de las burbujas de gas.

QUÉ CONTIENE perivan plus® ENZIMÁTICO
Cada tableta con recubrimiento entérico de **perivan plus® ENZIMÁTICO** contiene:

INGREDIENTE ACTIVO	ACCIÓN
Proteasa 30,000 U	Mejora la digestión de las proteínas
Amilasa 30,000 U.....	Mejora la digestión de los azúcares
Lipasa 8,000 U.....	Mejora la digestión de las grasas
Mosaprida citrato ..... dihidrato equivalente a Mosaprida citrato 5 mg	Regula la motilidad gastrointestinal
Dimetilpolisiloxano 60 mg...	Disminuye los gases digestivos
Excipientes c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO perivan plus® ENZIMÁTICO
perivan plus® ENZIMÁTICO tabletas con recubrimiento entérico está indicado para tratamiento y alivio de síntomas leves a moderados asociados con desórdenes gastrointestinales como: indigestión, agruras estomacales, ardores, reflujo gastroesofágico, constipación, dispepsia y flatulencia; algunos de los cuales acompañan la gastritis crónica. También para el tratamiento de dispepsia no ulcerosa y distensión postprandial.

CÓMO SE PRESENTA perivan plus® ENZIMÁTICO
perivan plus® ENZIMÁTICO tabletas con recubrimiento entérico se presenta en caja con 30 tabletas en burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN		
	Adultos: 2 tabletas antes de cada comida.	**Mayores de 65 años:** Según criterio médico.

Nota importante: la tableta no debe partirse.

Vía de administración oral.
La dosis puede variar para los diferentes pacientes.
Siga las indicaciones que le dé su médico.

ANTES DE USAR perivan plus® ENZIMÁTICO LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: infórmele a su médico si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- No administrar durante el embarazo y periodo de lactancia.
- No administrar en niños, debido a que no se ha comprobado su seguridad y eficacia.
- Administrar con precaución en pacientes con función hepática o renal disminuida.
- Uso con otros medicamentos: la administración simultánea con anticolinérgicos (sulfato de atropina, bromuro de butilescopolamina) puede disminuir la acción de Mosaprida citrato, por lo que se recomienda ampliar los intervalos de administración entre ambas medicaciones.

EFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, los más comunes son: diarrea, heces blandas, sequedad de boca, dolor abdominal, palpitaciones. Puede haber aumento de transaminasas hepáticas, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transferasa (GGT). Otros efectos adversos de incidencia rara son: astenia, mareos, vértigos, eosinofilia, aumento de grasas neutras.

USO ADECUADO DE perivan plus® ENZIMÁTICO

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **perivan plus® ENZIMÁTICO tabletas con recubrimiento entérico** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal.
  No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 ºC.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

COD. 53132
0100921

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE A.G.S.A.

Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com