

donofosfo[®]

FOSFOMICINA

infecciones urinarias complicadas o recurrentes

Polvo para solución oral

CONOCIENDO donofosfo[®]

donofosfo[®] 3 g es un medicamento que contiene como principio activo Fosfomicina, la cual es clasificada como un antibiótico de amplio espectro, por ser un agente bactericida que inhibe la síntesis de la pared celular al unirse de manera covalente a una cisteína en el sitio activo de la enzima UDP-N-acetil-glucosamina, dejándolas inactivas y causando de esta forma la muerte celular de las bacterias.

QUÉ CONTIENE donofosfo[®]

Cada 8 g de polvo para solución oral contiene:

Fosfomicina trometamol	5.63 g
equivalente a Fosfomicina	3.00 g
Excipientes c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donofosfo[®]

donofosfo[®] 3 g polvo para solución oral está indicado para el tratamiento de infecciones del tracto urinario complicadas o recurrentes.

CÓMO SE PRESENTA donofosfo[®]

donofosfo[®] 3 g polvo para solución oral se presenta en caja con un sobre y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presenta la dosis promedio usual:

3 g de Fosfomicina (1 sobre) una vez al día. Preferiblemente por las noches 2 horas antes o 2 horas después de comer.

Disolver el contenido de un sobre en un vaso (250 mL) de agua, beberlo inmediatamente.

ANTES DE USAR donofosfo[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a la fosfomicina o a cualquier otro medicamento o comida.
- La administración durante el embarazo y lactancia queda exclusivamente a criterio del médico, ya que no se ha establecido la seguridad de la Fosfomicina en dichos casos.

- No se debe administrar Fosfomicina a niños menores de 12 años, ya que no se ha establecido la seguridad y eficacia.
- Pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina menor a 10 mL/min) no deben utilizar este medicamento.
- Si usted está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica como antidiarreicos, medicamentos que interfieren con los movimientos del intestino (antiperistálticos) o metoclopramida, ya que pueden reducir la absorción de la Fosfomicina. Los anticoagulantes interfieren con la Fosfomicina y pueden alterar la capacidad de coagulación de la sangre.

EFFECTOS ADVERSOS

donofosfo[®] al igual que otros medicamentos puede presentar efectos adversos, entre ellos los más comunes en el tracto gastrointestinal son: diarrea de moderada a intensa, calambres en el abdomen y heces con sangre. Se puede presentar choque anafiláctico (un tipo de reacción alérgica potencialmente mortal), hinchazón de cara, labios, lengua y garganta con dificultad para respirar. Otros efectos adversos poco frecuentes son: dolor de cabeza, mareos, náuseas, indigestión, infección de los órganos genitales femeninos con síntomas como inflamación, irritación o picor (vulvovaginitis).

En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE donofosfo[®]

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omite la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C. Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Acondicionador primario FARMAQUILA S.A.
Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

