



dexidian®

DEXLANSOPRAZOL

Cápsulas con gránulos entéricos

CONOCIENDO dexidian®

dexidian® es un medicamento que contiene Dexlansoprazol que inhibe la bomba de protones y está clasificado como un antisecretoar, bloqueando el paso final de la secreción ácido gástrica en la superficie de las células secretoras parietales de la mucosa gástrica.

QUÉ CONTIENE dexidian®

dexidian® 30 mg cápsulas con gránulos entéricos

Cada cápsula con gránulos entéricos contiene:

Dexlansoprazol 30 mg

Excipientes c. s.

dexidian® 60 mg cápsulas con gránulos entéricos

Cada cápsula con gránulos entéricos contiene:

Dexlansoprazol 60 mg

Excipientes c. s.

EN QUE CASOS ESTÁ INDICADO dexidian®

dexidian® está indicado en el tratamiento de la esofagitis erosiva por reflujo. Tratamiento a corto plazo de la pirosis y la regurgitación ácida asociadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) no erosiva sintomática.

COMO SE PRESENTA dexidian®

dexidian® 30 mg cápsulas con gránulos entéricos se presenta en caja conteniendo 42 cápsulas con gránulos entéricos, contenidas en burbujas individuales de blíster de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y la luz ultravioleta, y el presente inserto.

dexidian® 60 mg cápsulas con gránulos entéricos se presenta en caja conteniendo 42 cápsulas con gránulos entéricos, contenidas en burbujas individuales de blíster de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales tanto para **dexidian® 30 mg** como para **dexidian® 60 mg**.

- Tratamiento de la esofagitis erosiva por reflujo: La dosis recomendada es de 60 mg una vez al día hasta por 8 semanas. Los pacientes que no hayan logrado una remisión completa en este tiempo, podrán continuar con el tratamiento a la misma otras 4 semanas.

- Tratamiento de mantenimiento de la esofagitis erosiva por reflujo ya tratada y del alivio de la pirosis: La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante un máximo de 6 meses en pacientes en los que se necesita una supresión ácida prolongada.

- Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) no erosiva sintomática: La dosis recomendada es de 30 mg una vez al día durante un máximo de 4 semanas. Las cápsulas deben tragarse enteras con algún líquido. Pueden tomarse con o sin alimentos.

ANTES DE USAR dexidian® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFORMELE A SU MÉDICO

Antes de iniciar un tratamiento con Dexlansoprazol debe descartarse la posibilidad de carcinoma gástrico, debido a que este medicamento puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico.

Se recomienda una supervisión médica periódica en pacientes sometidos a un tratamiento con Dexlansoprazol a largo plazo.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al Dexlansoprazol o alguno de sus componentes.
- No debe administrarse en combinación con la asociación atazanavir + ritonavir por el riesgo de disminución de los niveles plasmáticos de atazanavir.
- No debe administrarse en combinación con nelfinavir.
- No administrar en embarazo y/o lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Debido al metabolismo del Dexlansoprazol por el sistema citocromo P450, su isoenzima CYP2C19 y CYP3A4 puede prolongar la eliminación de cilostazol, diazepam, fenitoína y warfarina.

Puede afectar la absorción de desatinib, erlotinib, posaconazol, ketoconazol e itraconazol, ya que su absorción depende del pH del ácido gástrico.

Con voriconazol la concentración plasmática puede aumentar con ambos medicamentos.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos **dexidian®** puede producir efectos adversos como: diarrea, dolor abdominal, vómitos, cefalea, prurito, disnea, fatiga, rash, urticaria, boca seca.

USO ADECUADO DE dexidian®

No se administre más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.

Tome este medicamento durante todo el tiempo que indicó su médico.

Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30° C. Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com