

kralcolik®

TRIMEBUTINA MALEATO

antiespasmódico

Tabletas

CONOCIENDO kralcolik®

kralcolik® 200 mg tabletas es un medicamento antiespasmódico, que pertenece al grupo de agentes relajantes directos del músculo liso, que previenen o interrumpen los espasmos del músculo liso intestinal. Su mecanismo de acción es actuar sobre las miofibrillas del músculo liso del aparato digestivo, reduciendo el tono y el peristaltismo y aliviando los espasmos intestinales sin afectar de forma sustancial la motilidad gastrointestinal.

QUÉ CONTIENE kralcolik®

Cada tableta de **kralcolik®** contiene:
Trimebutina maleato 200 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kralcolik®

kralcolik® 200 mg tabletas está indicado en el tratamiento del síndrome de colon irritable (SCI) o colitis, ya que alivia los síntomas característicos de este padecimiento, como dolor abdominal tipo cólico, constipación y/o diarrea, distensión abdominal, meteorismo y flatulencia.

COMO SE PRESENTA kralcolik®

kralcolik® 200 mg tabletas se presenta en caja conteniendo 30 tabletas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presenta la dosis promedio usual:

Adultos

1 tableta de 200 mg 3 veces al día.

No exceder de 600 mg al día.

ANTES DE USAR kralcolik® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Infórmele a su médico si usted es alérgico a Trimebutina o alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.

- Se recomienda precaución en pacientes tratados con antihipertensivos debido a que la Trimebutina puede inducir en raras ocasiones hipotensión.
- No se recomienda el uso de Trimebutina durante el embarazo especialmente durante el primer trimestre.

EFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, entre ellos los más comunes son: sequedad de boca, náusea, diarrea, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, fatiga. Si cualquiera de estos u otros síntomas no esperados se presentan consulte a su médico.

USO ADECUADO DE kralcolik®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómelas tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.
- Tome este medicamento durante el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com

Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

