kolpas® *compuesto*

PROPINOXATO CLORHIDRATO
CLONIXINATO DE LISINA

antiespasmódico y analgésico

- Tabletas recubiertas
- Solución inyectable

CONOCIENDO kolpas® *compuesto*
kolpas® *compuesto* es un medicamento que contiene como principios activos el Propinoxato clorhidrato, que es un antiespasmódico, es decir que actúa eliminando los cólicos, y el Clonixinato de lisina, un analgésico que complementa la eficacia del producto aliviando el dolor.

QUÉ CONTIENE kolpas® *compuesto*
kolpas® *compuesto* tabletas recubiertas
Cada tableta recubierta contiene:
Propinoxato clorhidrato 10 mg
Clonixinato de lisina 125 mg
Excipientes c.s.

kolpas® *compuesto* solución inyectable
Ampolla No. 1 de 2 mL contiene:
Propinoxato clorhidrato 15 mg
Vehículo c.s.

Ampolla No. 2 de 2 mL contiene:
Clonixinato de lisina 100 mg
Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kolpas® *compuesto*
kolpas® *compuesto* está indicado para:
- Cólicos gastrointestinales.
- Espasmo que se presenta en el estómago, esófago, riñón y vías biliares.
- Dolores de la vesícula biliar.
- Disfagia (dolores al tragar los alimentos).
- Disuria (ardor al orinar).
- Cólicos hepáticos.

CÓMO SE PRESENTA kolpas® *compuesto*
kolpas® *compuesto* tabletas recubiertas se presenta en carterita con 10 tabletas recubiertas contenidas en burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta.

kolpas® *compuesto* solución inyectable se presenta en una caja que contiene tres dosis, cada dosis está formada por dos ampollas con sistema abrefácil que se encuentran en el mismo blíster. Una ampolla está marcada con el No. 1 y la otra con el No. 2. También se incluyen tres jeringas y sus respectivas toallitas con alcohol y el presente inserto.
La administración debe hacerse según instructivo adjunto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
La dosis puede variar en los diferentes pacientes dependiendo del tipo y severidad de la enfermedad. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Producto	Dosis	Vía de Administración
kolpas® *compuesto* solución inyectable	Adultos: 1 a 3 dosis diarias. En caso necesario pueden inyectarse hasta 2 dosis juntas sin inconveniente. Cada dosis está formada por la mezcla en una jeringa de una ampolla No. 1 y una ampolla No. 2. Lea el instructivo de uso adjunto.	**Intramuscular o intravenosa** (lenta o bajo supervisión médica). 
kolpas® *compuesto* tabletas recubiertas	Adultos y niños mayores de 10 años: 1 a 2 tabletas 3 a 5 veces al día.	**Oral**

Niños: Para su administración se recomienda el uso de **kolpas® solución oral gotas.**

ANTES DE USAR kolpas® *compuesto* LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO
- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a cualquiera de los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o alimento.
- Infórmele a su médico en caso de padecer:
  -Glaucoma (presión elevada en el ojo).
  -Hipertrofia prostática (enfermedad de la próstata).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 ºC.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

0090518

KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.
DIVISIÓN DE LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE A.G.S.A.

kral®

COD. 53357

Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com