

# donosartán®

CANDESARTÁN CILEXETILO

**antihipertensivo**

Tabletas

## CONOCIENDO donosartán®

**donosartán® 16 mg** y **donosartán® 32 mg** contienen como principio activo el Candesartán cilexetilo, que es un antagonista oral de los receptores de Angiotensina II, utilizado para disminuir la presión arterial elevada en adultos.

También se recomienda en pacientes que no toleran los medicamentos inhibidores de la ECA. **donosartán®** tiene la propiedad de relajar y dilatar los vasos sanguíneos, produciendo la disminución de la presión arterial y mejorando además el trabajo cardíaco.

## QUÉ CONTIENE donosartán®

Cada tableta de **donosartán® 16 mg** contiene:  
Candesartán cilexetilo 16 mg  
Excipientes c.s.

Cada tableta de **donosartán® 32 mg** contiene:  
Candesartán cilexetilo 32 mg  
Excipientes c.s.

## EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donosartán®

**donosartán®** tratamiento para personas con trastornos de presión arterial aumentada (hipertensión):

- Tratamiento de la hipertensión esencial en adultos.
- Tratamiento de pacientes adultos con insuficiencia cardíaca y reducción de la función sistólica ventricular izquierda.
- Tratamiento de la hipertensión arterial cuando el paciente no tolera los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).

## CÓMO SE PRESENTA donosartán®


**donosartán®** se presenta en caja con 30 tabletas en blíster de foil de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

Debe ser administrado una vez al día con o sin alimentos, siempre a la misma hora, todos los días.

La dosis usual inicial es de una tableta al día.

DOSIFICACIÓN	ADULTOS Y ANCIANOS
	1 tableta al día

Se recomienda seguir las instrucciones que le dé su médico.

La dosis inicial que se recomienda en adultos es de 8 mg diario. Si la presión arterial no se controla con esta dosis, puede incrementarse a 16 mg diario y se puede incrementar hasta 32 mg diario como dosis máxima, dependiendo de la dosis respuesta. Generalmente el efecto antihipertensivo efectivo se logra a las 4 semanas de tratamiento.

El tratamiento debe ajustarlo su médico de acuerdo con la respuesta de la presión arterial.

En personas que tienen el riesgo de hipotensión, se debe iniciar con dosis de 4 mg.

En personas con problemas en la función renal, pacientes en hemodiálisis y personas con alteraciones de la función hepática se recomienda iniciar con una dosis de 4 mg diario. La dosis debe irse ajustando de acuerdo con la dosis respuesta.

## ANTES DE USAR donosartán® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

No se recomienda su uso si presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Si es alérgico a algún componente de la fórmula.
- Si es alérgico a las sulfonamidas.
- Si tiene enfermedad grave del riñón o del hígado.
- Si tiene niveles altos de calcio en sangre.
- Si tiene alteraciones de potasio en sangre.
- Si tiene diabetes o insuficiencia renal y está tomando aliskerén.
- Si tiene Gota o ha padecido de esta enfermedad.
- Si está embarazada o está en periodo de lactancia.

No se recomienda su uso si presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Si tiene vómitos y/o diarrea.
- Si tiene problemas de la glándula suprarrenal.
- Si alguna vez ha tenido ictus.
- Si ha padecido de asma o alergia.
- Si está tomando algún tratamiento para reducir la hipertensión arterial, como los inhibidores de la ECA (enalapril, captopril, lisinopril o ramipril).
- Si ha tenido problemas de riñón relacionados con la diabetes.

- Si va a someterse a alguna cirugía.
- Si toma alguno de los siguientes tratamientos: calcio, medicina para reducir el colesterol, antiarrítmicos, heparina, diuréticos, penicilina, Litio, prednisolona, barbitúricos, ACTH, penicilina y laxantes.
- Si tiene la impresión que el efecto es muy fuerte o muy débil, comuníquelo a su médico.

### EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, los más comunes son: dolor de cabeza, mareo, hipotensión, hiperkalemia, disminución de glóbulos rojos, cansancio, erupción cutánea y dolor de espalda.

Suspenda su uso y consulte a su médico si se presentan algunos de los efectos adversos.

### USO ADECUADO DE donosartán®

- No mezclar con alcohol, porque puede experimentar desmayos o mareos.
- No combinar con AINEs, particularmente Ácido acetilsalicílico.
- Su médico le indicará la duración de su tratamiento. No suspenda el tratamiento si el médico no lo indica.
- Si usted olvida una dosis, tomela tan pronto sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- **Solo se debe usar en adultos.**
- Si está tomando **donosartan®** podría dar positivo en pruebas de control de dopaje.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

COD. 53389

0031120

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
 A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com) Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)