

# nebralgia®

## GABAPENTINA - TIAMINA - METILCOBALAMINA

### tratamiento de la neuropatía

#### tabletas recubiertas

#### CONOCIENDO nebralgia®

**nebralgia® tabletas recubiertas** contiene como principio activo la Gabapentina, que es un derivado del neurotransmisor GABA (ácido gamma amino butírico), aunque posee propiedades parecidas al GABA, se usa para aliviar el dolor crónico ocasionado por daño en los nervios, aunque su mecanismo de acción aún no está bien establecido. De acuerdo a resultados "in vitro" la Gabapentina reduce la liberación de neurotransmisores monoaminérgicos como la serotonina. La tiamina (vitamina B1), mejora la síntesis y liberación de acetilcolina, lo que a su vez fortalece el funcionamiento de las terminaciones nerviosas. La tiamina alivia el dolor al mejorar la velocidad de la conducción nerviosa. Algunos estudios mencionan que los síntomas de neuropatía diabética aumentan cuando hay bajos niveles de tiamina. La metilcobalamina que es una forma activa de la vitamina B12, es necesaria para la formación de la mielina en las terminaciones nerviosas y para mantener la integridad del tejido neuronal. El déficit de vitamina B12 por período prolongado produce neuropatía.

#### QUÉ CONTIENE nebralgia®

Cada tableta recubierta contiene:

Gabapentina	300 mg
Tiamina Mononitrato (Vitamina B1)	100 mg
Metilcobalamina (Vitamina B12)	0.20 mg
Excipientes c.s.	

#### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO nebralgia®

**nebralgia® tabletas recubiertas** está recomendado para prevenir y tratar la neuropatía posterior a un cuadro del virus de la varicela zoster y del virus del herpes zoster. Para tratamiento de la polineuropatía diabética dolorosa. En la neuralgia del Trigémino o lesión traumática de los nervios. También se usa en la neuropatía de pacientes con cáncer, esclerosis múltiple o infección por virus del VIH; así como en el Síndrome distrofia simpática refleja (Síndrome Doloroso regional complejo) y el Síndrome del miembro fantasma.

#### CÓMO SE PRESENTA nebralgia®

**nebralgia® tabletas recubiertas** se presenta en caja con 30 tabletas en blíster de foil de aluminio/pvc que las protegen de la humedad y la luz ultravioleta, y el presente inserto.

#### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede variar para los diferentes pacientes. Siga las indicaciones que le dé su médico.

Para dolor neuropático o neuralgia post herpética en adultos: tomar 300 mg el primer día, 300 mg cada 12 horas el segundo día y 300 mg cada 8 horas el tercer día. La dosis recomendada es la dosis mínima necesaria para alcanzar el alivio del dolor sin exceder los 1800 mg/día, dividida en tres tomas. En personas con insuficiencia renal se recomienda ajustar la dosis, ya que la Gabapentina se elimina por vía renal.

La tableta recubierta debe ser tragada entera. No masticar.

#### ANTES DE USAR nebralgia® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- No se debe usar en niños y jóvenes.
- No debe usarse durante el embarazo y lactancia.
- No administrar a pacientes alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No debe usarse en la neuropatía óptica de Leber.
- Pacientes que han sido tratados con morfina pueden requerir una adecuación de la dosis.
- No tomar junto con Omeprazol ya que reduce la absorción de la vitamina B12.
- No tomar junto con Cloranfenicol pues antagoniza la respuesta hematopoyética a la vitamina B12.
- No tomar con Hidróxido de aluminio y magnesio, ya que reduce la absorción de la Gabapentina.
- La Cimetidina disminuye la excreción de la Gabapentina, mientras que la morfina aumenta su excreción por orina.
- El tratamiento con Gabapentina no debe discontinuarse de forma abrupta.

#### EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes pueden ser: diarrea, flatulencia, náusea, sequedad de la boca.  
Respiratorios: rinitis, faringitis y tos.

Se recomienda suspender ante la aparición de los siguientes síntomas:

- Hipertensión.
- Dermatológicas: acné, prurito, eccema, rara vez Sd. de Steven Johnson.
- Neurológicos: insomnio, nerviosismo, temblor, somnolencia, entre otros.

#### **USO ADECUADO DE nebralgia®**

- Su médico le indicará la duración de su tratamiento. No suspenda el tratamiento antes de lo indicado.
- Si ha olvidado tomar su medicamento no tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
- Debe suministrarse bajo prescripción médica.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

COD. 53391 0040121

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
**A.G.S.A.**



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro  
Departamento Médico en Guatemala  
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)