



viridon[®] 5 mg

TADALAFILO

tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata

Tabletas

CONOCIENDO viridon[®]

viridon[®] es un medicamento que contiene como principio activo Tadalafilo, el cual es un inhibidor reversible y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) específica del guanosín monofosfato cíclico (GMPc), la inhibición de la PDE5 por Tadalafilo ocasiona un aumento de los niveles de GMPc en los cuerpos cavernosos. El resultado es la relajación del musculo liso de la próstata, vejiga y su vascularización. La relajación vascular que se produce, aumenta la perfusión sanguínea, el cual podría ser el mecanismo por el cual se reducen los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata. Estos efectos vasculares pueden estar complementados por la inhibición de la actividad del nervio aferente de la vejiga y su relajación y la relajación del musculo liso de la próstata.

QUÉ CONTIENE viridon[®]

Cada tableta de **viridon[®] 5 mg** contiene:
Tadalafilo 5 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO viridon[®]

viridon[®] 5 mg tabletas está indicado para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata en hombres adultos.

CÓMO SE PRESENTA viridon[®]

viridon[®] 5 mg tabletas se presenta en caja con 30 tabletas contenidas en burbujas de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes, siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presenta la dosis promedio usual:

La dosis recomendada es de 5 mg (1 tableta) una vez al día aproximadamente a la misma hora, con o sin alimentos.

ANTES DE USAR viridon[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Infórmele a su médico si es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- Su uso debe ser bajo estricta vigilancia médica.
- Antes de comenzar el tratamiento con **viridon[®]** se debe descartar la presencia de un carcinoma de próstata o cualquier enfermedad cardiovascular, si se ha sufrido recientemente un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, si padece de hipertensión arterial o hipotensión arterial no controlada.
- Si usted tiene un tratamiento concomitante con medicamentos antihipertensivos es posible que se requiera un ajuste de dosis a su medicamento, ya que Tadalafilo puede causar una disminución de la presión sanguínea.
- Consulte a su médico antes de tomar **viridon[®]** si usted padece de: anemia falciforme (anormalidad de los glóbulos rojos), mieloma múltiple (cáncer de la médula ósea) o leucemia (cáncer de las células sanguíneas).
- Se debe suspender el uso de **viridon[®]** y buscar ayuda médica en caso de la pérdida repentina de la visión en uno o en ambos ojos, y en el caso de la pérdida o disminución de la audición.
- En pacientes con daño hepático leve o moderado el médico debe ajustar la dosis. En pacientes con daño hepático severo no se recomienda el uso de **viridon[®]**.
- En pacientes con daño renal con depuración de creatinina de 30-50 mL/min el médico debe ajustar la dosis. En pacientes con depuración de creatinina <30 mL/min la dosis de **viridon[®]** no debe exceder a 5 mg cada 72 horas.
- Utilizar con precaución en pacientes geriátricos.
- Infórmele a su médico si está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, como lo son ketoconazol, rifampicina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, nitratos orgánicos, antiácidos orales, alfa-bloqueadores, antihipertensivos o cantidades sustanciales de alcohol, ya que pueden producir hipotensión.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos se puede presentar efectos adversos, entre ellos los más comunes son:

- Dolor de cabeza
- Indigestión o acidez estomacal
- Nauseas
- Mareos
- Estreñimiento
- Rubor
- Congestión nasal
- Dolor en el estómago, la espalda, músculos, brazos o las piernas.

Se recomienda suspender su uso y consultar con su médico si se presentan alguno de los efectos adversos mencionados o algún otro efecto adverso que no aparezca en la lista.

USO ADECUADO DE viridon®

- Tome **viridon®** durante el tiempo que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.
- Únicamente su médico puede aumentar o disminuir la dosis del medicamento, dependiendo de cómo reaccione su cuerpo y de su condición de salud.
- No tome **viridon®** más de una vez al día.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

Última Revisión 24/02/2,022

V.00202022

COD. 53407



LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com