

viridon® MAX

TADALAFILO

tratamiento de la disfunción eréctil

Tabletas

CONOCIENDO viridon® MAX

viridon® MAX 20 mg tabletas es un medicamento que contiene como principio activo Tadalafilo, el cual es un inhibidor reversible y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) específica del guanosín monofosfato cíclico (GMPc). Cuando la estimulación sexual produce la liberación local de óxido nítrico, la inhibición de la PDE5 por Tadalafilo ocasiona un aumento de los niveles de GMPc en los cuerpos cavernosos. El resultado es la relajación del músculo liso, permitiendo la afluencia de sangre en los tejidos del pene, produciendo por lo tanto una erección. Tadalafilo no produce efectos en ausencia de estimulación sexual.

QUÉ CONTIENE viridon® MAX

Cada tableta de **viridon® MAX** contiene:
Tadalafilo 20 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO viridon® MAX

viridon® MAX 20 mg tabletas está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil en hombres adultos.

CÓMO SE PRESENTA viridon® MAX

viridon® MAX 20 mg tabletas se presenta en caja con 4 tabletas contenidas en burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presenta la dosis promedio usual:

La dosis inicial recomendada es de 10 mg (1/2 tableta) de **viridon® MAX 20 mg tabletas** media hora antes de la actividad sexual. Si el efecto de esta dosis es demasiado débil, el médico puede aumentar la dosis a 20 mg (1 tableta) basándose en la eficacia y tolerancia individual. Después de la administración se mejora la función eréctil hasta por 36 horas.

No se debe tomar **viridon® MAX 20 mg tabletas** más de una vez al día y no se recomienda su uso diario continuo.

ANTES DE USAR viridon® MAX LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Infórmele a su médico si es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- Su uso debe ser bajo estricta vigilancia médica.
- No se recomienda su uso en hombres que no padezcan disfunción eréctil, en diabéticos e hipertensos con cardiopatía, si se ha sufrido recientemente un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, si padece de hipertensión arterial o hipotensión arterial no controlada.
- El médico debe establecer el estado cardiovascular del paciente y el grado de riesgo cardíaco asociado a la actividad sexual, para definir si es recomendable tomar **viridon® MAX 20 mg tabletas**.
- Consulte a su médico antes de tomar **viridon® MAX 20 mg tabletas** si usted padece de: anemia falciforme (anormalidad de los glóbulos rojos), mieloma múltiple (cáncer de la médula ósea) o leucemia (cáncer de las células sanguíneas).
- Se debe suspender el uso de **viridon® MAX 20 mg tabletas** y buscar ayuda médica en caso de la pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos, y en el caso de la pérdida o disminución de la audición.
- En pacientes con daño hepático leve o moderado, el médico debe ajustar la dosis. En pacientes con daño hepático severo no se recomienda el uso de **viridon® MAX 20 mg tabletas**.
- En pacientes con daño renal con depuración de creatinina de 30-50 mL/min el médico debe ajustar la dosis. En pacientes con depuración de creatinina <30 mL/min la dosis de **viridon® MAX 20 mg tabletas** no debe exceder a 5 mg cada 72 horas.
- Utilizar con precaución en pacientes geriátricos.
- Infórmele a su médico si está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, como lo son fenitoína, ketoconazol, rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, nitratos orgánicos, antiácidos orales, alfa-bloqueadores, antihipertensivos o cantidades sustanciales de alcohol, ya que pueden producir hipotensión.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos se puede presentar efectos adversos, entre ellos los más comunes son:

- Dolor de cabeza
- Indigestión o acidez estomacal
- Náuseas
- Mareos
- Estreñimiento
- Rubor
- Congestión nasal

- Dolor en el estómago, la espalda, músculos, brazos o las piernas.

Se recomienda suspender su uso y consultar con su médico si se presentan alguno de los efectos adversos mencionados o algún otro que no aparezca en la lista.

USO ADECUADO DE viridon® MAX

- No administre más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico. No duplique la dosis.
- Únicamente su médico puede aumentar o disminuir la dosis de **viridon® MAX 20 mg tabletas** dependiendo de cómo reaccione su cuerpo y de su condición de salud.
- No utilice **viridon® MAX 20 mg tabletas** en conjunto con otros medicamentos destinados para el tratamiento de la difusión eréctil.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

Última Revisión 16/03/2,022

V.0020322

COD.53416



LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com