
esovan[®]

ESOMEPRAZOL

inhibidor de la bomba de protones

esovan[®] 20 mg cápsulas con pellets de liberación retardada

esovan[®] 40 mg cápsulas con pellets de liberación retardada

CONOCIENDO esovan[®]

esovan[®] contiene como principio activo Esomeprazol, el cual pertenece al grupo de los inhibidores de la bomba de protones que actúa en el tracto gastrointestinal, reduciendo la secreción del ácido gástrico al inhibir la ATPasa de la membrana celular de las células parietales del estómago, por ello se le clasifica como un agente antiulceroso. Esomeprazol es un isómero del Omeprazol, lo que hace que posea una acción más rápida, potente y prolongada.

QUÉ CONTIENE esovan[®]

Cada cápsula con pellets de liberación retardada de **esovan[®] 20 mg** contiene:

Esomeprazol magnésico equivalente a 20 mg de Esomeprazol
Excipientes c.s.p

Cada cápsula con pellets de liberación retardada de **esovan[®] 40 mg** contiene:

Esomeprazol magnésico equivalente a 40 mg de Esomeprazol
Excipientes c.s.p

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO esovan[®]

esovan[®] está indicado para el tratamiento de:

- Úlcera péptica y duodenal.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico y su profilaxis.
- Gastritis aguda y crónica.
- Síndrome de Zollinger-Ellison.
- Úlceras asociadas al uso de AINE's (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos); así como su prevención.
- Como coadyuvante en el tratamiento de la infección gástrica causada por *Helicobacter pylori*, para la cicatrización de úlceras asociadas a esta.

CÓMO SE PRESENTA esovan[®]

esovan[®] 20 mg cápsulas con pellets de liberación retardada se presenta en caja con 30 cápsulas con pellets de liberación retardada en blíster de Aluminio/Aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

esovan[®] 40 mg cápsulas con pellets de liberación retardada se presenta en caja con 15 y 30 cápsulas con pellets de liberación retardada en blíster de Aluminio/Aluminio que las protege de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto. Dispensador de 100 cápsulas con pellets de liberación retardada en sobres de 5 cápsulas cada uno. Dentro de los sobres se encuentran en blíster de Aluminio/Aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

Tomar la dosis por lo menos una hora antes de las comidas, preferiblemente antes del desayuno. Las cápsulas deben ingerirse enteras.

La dosis puede ser distinta para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

- Esofagitis por reflujo gastroesofágico: 40 mg una vez al día por 4 a 8 semanas.
- Reflujo gastroesofágico sintomático: 40 mg una vez al día por 4 semanas.
- Mantenimiento contra reincidencia de esofagitis erosiva: 20-40 mg una vez al día el tiempo que el médico indique.
- Úlcera duodenal asociada a infección por *H. pylori*: 40 mg dos veces al día por 10 días en conjunto con una terapia antibacteriana indicada por el médico.
- Úlcera gástrica: 40 mg una vez al día por 4 semanas, que en algunos pacientes puede prolongarse por 4 semanas más para completar la cicatrización.
- Úlcera gástrica asociada a la administración de AINE's: 40 mg una vez al día durante 4 a 8 semanas.
- Síndrome de Zollinger-Ellison: 40 mg dos veces al día. La dosis y el tiempo del tratamiento deben ajustarse de manera individual, según lo indicado por el médico.

ANTES DE USAR esovan[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** Infórmele a su médico si es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida. **esovan[®]** contiene Tartrazina, no administrar a personas que presenten sensibilidad a la Tartrazina.
- Antes de iniciar un tratamiento con **esovan[®]** debe descartarse la posibilidad de carcinoma gástrico, debido a que este medicamento puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico.

- Se recomienda una supervisión médica periódica en pacientes sometidos a un tratamiento con Esomeprazol a largo plazo, especialmente si padece de osteoporosis o si toma algún corticosteroide ya que puede aumentar ligeramente el riesgo de que se fracture la cadera, muñeca y columna vertebral.
- Infórmele a su médico si está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica como lo son: ketoconazol, itraconazol, warfarina, diazepam, citalopram o fenitoína, ya que su metabolismo y absorción se ven afectados en presencia de Esomeprazol.
- No administrar en embarazo, lactancia y en niños menores de 12 años.

EFFECTOS ADVERSOS

esovan® así como otros medicamentos puede presentar efectos no deseados como:

- Diarrea
- Cefalea
- Náusea
- Flatulencia
- Estreñimiento
- Dolor abdominal

En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE esovan®

- Tome **esovan®** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

