
oxcarvan®

OXCARBAZEPINA

antiepiléptico

- Suspensión oral
- Tabletas recubiertas

CONOCIENDO oxcarvan®

oxcarvan® contiene como principio activo Oxcarbazepina, un agente antiepiléptico utilizado en el tratamiento de las convulsiones de inicio parcial. Su mecanismo de acción se debe principalmente al bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que produce una estabilización de las membranas neuronales hiperexcitadas, así como una inhibición de la descarga neuronal repetitiva y una reducción de la propagación de impulsos sinápticos. Además, el incremento de la conductancia de potasio y la modulación de los canales de calcio activados por alto voltaje, pueden también contribuir a los efectos anticonvulsivantes. No se han hallado interacciones significativas con receptores moduladores ni con neurotransmisores cerebrales.

QUÉ CONTIENE oxcarvan®

oxcarvan® 60 mg/1 mL suspensión oral

Cada 1 mL de suspensión oral contiene:
Oxcarbazepina 60 mg
Vehículo c.s.

oxcarvan® 300 mg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Oxcarbazepina 300 mg
Excipientes c.s.

oxcarvan® 600 mg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Oxcarbazepina 600 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO oxcarvan®

oxcarvan® está indicado en el tratamiento de crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria con crisis tónico-clónicas (convulsiones).

CÓMO SE PRESENTA oxcarvan®

oxcarvan® 60 mg/1 mL suspensión oral se presenta en caja con frasco de vidrio ámbar conteniendo 120 mL de suspensión, vasito dosificador, tapa con mecanismo de seguridad para niños, y el presente inserto. Para abrir el frasco presionar el tapón hacia abajo y girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

oxcarvan® 300 mg tabletas recubiertas se presenta en caja con 20 y 30 tabletas recubiertas dentro de burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

oxcarvan® 600 mg tabletas recubiertas se presenta en caja con 30 tabletas recubiertas dentro de burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos

600 mg una vez al día o 300 mg dos veces al día.

Niños mayores de 6 años

La dosis debe ser calculada por el médico y depende del peso del niño. Se recomienda una dosis inicial de 8 a 10 mg/Kg/día administrada 2 veces al día.

El médico puede aumentar gradualmente la dosis hasta obtener la mejor respuesta, tanto para adultos como para niños.

La dosis máxima para adultos es de 2400 mg al día y para niños es de 46 mg/Kg/día.

ANTES DE USAR oxcarvan® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: Si es alérgico a la Oxcarbazepina o a cualquier otro medicamento o comida.
- Si padece insuficiencia renal y/o hepática, ya que debe realizarse un ajuste de dosis.
- Si toma algún diurético, ya que puede ocasionar hiponatremia (concentración baja de sodio en la sangre).
- Si está tomando anticonceptivos a base de hormonas, ya que la Oxcarbazepina disminuye la efectividad de estos.
- No ingerir bebidas alcohólicas, ya que se aumentan los efectos sedantes de Oxcarbazepina.
- No se recomienda su uso en niños menores a 6 años.
- No administrar si esta embarazada o en planeación, ya que no existen estudios de seguridad, por lo que su uso debe ser únicamente si los beneficios justifican el riesgo potencial para el feto.
- Si se encuentra en periodo de lactancia, se debe suspender, ya que la Oxcarbazepina se puede excretar por medio de la leche, lo que puede producir efectos adversos en el lactante.
- Evitar el manejo de vehículos y maquinaria pesada mientras consume **oxcarvan®**, ya que podría causarle mareos, somnolencia y cansancio excesivo.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos, **oxcarvan®** puede presentar efectos adversos tales como: cansancio, dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, mareos, vómitos, visión doble, visión

borrosa, hiponatremia, temblores, falta de coordinación, movimientos involuntarios de los ojos, nerviosismo y ansiedad, mal humor y depresión, erupciones cutáneas, trastornos de la memoria, dificultad de concentración, apatía, agitación, confusión, estreñimiento, diarrea, dolor de estómago, acné y pérdida del cabello.

En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE oxcarvan®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

Ultima Revisión 17/08/2022

V.0060822

COD. 531 89



LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A. 

Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com farmacovigilancia.gt@gmail.com farmacovigilancia@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com