
kadec®

VITAMINAS A, C, D, E

contribuye a disminuir la frecuencia, intensidad y duración de los catarros y estados gripales

solución oral

CONOCIENDO kadec®

kadec® es un complemento vitamínico que constituye un tratamiento de acción prolongada debido al almacenamiento de las vitaminas A, D y E en el hígado, liberándose según las necesidades del organismo. La Vitamina A es esencial en el funcionamiento de la retina e integridad de los epitelios, es necesaria para el desarrollo y crecimiento de huesos, dientes y tejidos. La Vitamina C interviene en gran número de reacciones bioquímicas especialmente en las de oxidación, participa en la síntesis de sustancias intercelulares de los tejidos, incluyendo el colágeno, la matriz ósea y dental. La Vitamina D es necesaria para la mineralización normal de los huesos y desempeña un papel esencial en la regulación de calcio y fosfato dentro del organismo. Y por último la Vitamina E que evita la oxidación de componentes celulares esenciales o la formación de productos de oxidación tóxicos, facilita la absorción, almacenamiento y utilización de la Vitamina A.

QUÉ CONTIENE kadec®

kadec® solución oral para adultos

Cada 5 mL de solución oral contienen:

Ácido ascórbico (Vitamina C)	60 mg
Vitamina A (como Palmitato)	75,000 UI
Vitamina D (como Colecalciferol)	15,000 UI
Vitamina E (como Acetato dL alfatocoferol)	30 mg
Vehículo c.s.	

kadec® solución oral para niños

Cada 2 mL de solución oral contienen:

Ácido ascórbico (Vitamina C)	40 mg
Vitamina A (como Palmitato)	37,500 UI
Vitamina D (como Colecalciferol)	7,500 UI
Vitamina E (como Acetato dL alfatocoferol)	10 mg
Vehículo c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kadec®

kadec® están indicados para:

- Contribuir en la disminución de la frecuencia, intensidad y duración de los catarros y estados gripales.
- Deficiencias y carencias de las vitaminas A, C, D y E.
- Refuerzo a nivel broncopulmonar.
- Normalización de la visión.
- Raquitismo.
- Problemas de crecimiento.
- Favorece el desarrollo normal de los huesos y dientes.

CÓMO SE PRESENTA kadec®

kadec® solución oral para adultos se presenta en caja con 3 ampollas bebibles de color ámbar con sistema abre fácil de 5 mL cada una y el presente inserto.

kadec® solución oral para niños se presenta en caja con 3 ampollas bebibles de color ámbar con sistema abre fácil de 2 mL cada una y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

kadec® solución oral para:	DOSIS	DURACIÓN
Niños de 1 a 11 años (ampolla bebible de 2 mL)	1-2 ampollas	cada 15 días
Niños mayores de 12 años y adultos (ampolla bebible de 5 mL)	1 ampolla	cada 15 días

Se aconseja de preferencia mezclar el contenido de la ampolla con jugo de frutas, leche o algún líquido que sirva como vehículo.

ANTES DE USAR kadec® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: infórmele a su médico si es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- Por su contenido de Vitamina D y A, la administración durante el embarazo queda a criterio médico.
- No debe utilizarse en estados de hipervitaminosis A o D, en insuficiencia renal o hepática, durante la terapia con retinoides o con Vitamina D.
- Por su contenido en Vitamina D, debe considerarse su uso en pacientes con disfunción renal, cardíaca, arterioesclerosis e hiperfosfatemia.
- Si padece sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas por potencial aumento de la sensibilidad a Vitamina D.
- Deben tener precaución en pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales, diuréticos tiazídicos, glucósidos digitálicos.
- Administrar con precaución en personas predispuestas a padecer cálculos renales o gota.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos **kadec**[®] puede presentar efectos adversos tales como: náuseas, vómitos, prurito e irritación y cálculos en el tracto urinario si el paciente esta predisuesto.

Se recomienda suspender su uso y consultar a su médico si se presenta alguno de los efectos adversos mencionados o algún otro que no se haya mencionado.

USO ADECUADO DE kadec[®]

- No tomar más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **kadec**[®] durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

Ultima Revisión 01/08/2,022

V.0020822

COD. 53190

