

kralvir-us®

ACICLOVIR

antivírico-antiherpético

- Tabletas recubiertas
- Suspensión oral
- Crema tópica

CONOCIENDO kralvir-us®

kralvir-us® es un medicamento que contiene como principio activo Aciclovir, el cual es análogo de la guanosina y pertenece al grupo de los antivirales. Su acción se debe a que el Aciclovir impide la reproducción de diferentes virus, bloqueando el proceso de replicación de ADN a través de la inhibición del ADN polimerasa viral. Una de las ventajas del Aciclovir es que posee una amplia ventana terapéutica, lo que hace que la sobredosis sea rara en pacientes sanos. Es por esta razón que se puede utilizar Aciclovir para el tratamiento de diversas afecciones causadas por virus tanto en adultos como en niños.

QUE CONTIENE kralvir-us®

kralvir-us® 800 mg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Aciclovir 800 mg
Excipientes c.s.

kralvir-us® 200 mg /5 mL suspensión oral

Cada 5 mL de suspensión oral contienen:
Aciclovir 200 mg
Vehículo c.s.

kralvir-us® 5% crema tópica

Cada 100 gramos de crema tópica contienen:
Aciclovir 5 g
Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kralvir-us®

kralvir-us® está indicado para el tratamiento de diversas afecciones causadas por virus como:

- Herpes simplex de piel y mucosas
- Herpes genital inicial o recurrente
- Herpes zóster
- Varicela
- Epstein Barr

CÓMO SE PRESENTA kralvir-us®

kralvir-us® 800 mg tabletas recubiertas

Se presenta en caja con 10 tabletas recubiertas, contenidas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.



kralvir-us® 200 mg /5 mL suspensión oral

Se presenta en caja con envase ámbar conteniendo 120 mL de suspensión, vasito dosificador, y el presente inserto.



kralvir-us® 5% crema tópica

Se presenta en caja conteniendo un tubo colapsable con 5 g de crema, protegido en blíster, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

kralvir-us® 800 mg tabletas recubiertas y

kralvir-us® 200 mg /5 mL suspensión oral

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

NIÑOS

INFECCIONES POR	INMUNOCOMPETENTES	INMUNOCOMPROMETIDOS
Herpes simplex	Mayores de 2 años, 5 mL de suspensión oral cada 4 horas (mientras esté despierto), por un periodo de 5 a 10 días.	Mayores de 2 años, 10 mL de suspensión oral cada 4 horas (mientras esté despierto).
Herpes zóster	Según criterio médico.	Según criterio médico.
Varicela	Mayores de 2 años: 20 mg/kg de peso hasta un máximo de 800 mg, cada 6 horas por un periodo de 5 días.	Según criterio médico.

Para niños menores de 2 años de edad, la dosis es a criterio médico.

ADULTOS

INFECCIONES POR	INMUNOCOMPETENTES	INMUNOCOMPROMETIDOS
Herpes simplex	200 mg cada 4 horas durante el día (omitir las dosis nocturnas o mientras se duerme).	400 mg cada 4 horas durante el día (omitir las dosis nocturnas o mientras se duerme).
Herpes zóster	200 mg cada 4 horas, 5 veces al día, (omitir la dosis nocturna), durante un periodo de 7 a 10 días.	200 mg cada 4 horas, 5 veces al día, (omitir la dosis nocturna) durante un periodo de 7 a 10 días o según criterio médico.
Varicela	800 mg al día, dividida en 4 dosis al día (cada 4 o 5 horas, omitiendo las dosis nocturnas), por un periodo de 7 días.	800 mg al día, dividida en 4 dosis al día (cada 4 o 5 horas, omitiendo las dosis nocturnas), por un periodo de 7 días.

kralvir-us® 5% crema tópica

Vía de administración tópica.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico.

A continuación se presenta la dosis promedio usual:

Niños y adultos

Aplicar 5 o 6 veces al día sobre el área afectada, por un periodo de 5 a 10 días.

ANTES DE USAR kralvir-us® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E NFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos al Aciclovir, o a cualquier otro medicamento o comida.
- Su uso y dosificación en el embarazo y durante la lactancia, deberá ser exclusivamente bajo indicación y supervisión del médico.
- Ancianos y pacientes con disminución renal: la dosificación será según niveles de creatinina sérica y bajo supervisión del médico.
- En mujeres con una vida sexualmente activa se recomienda realizarse el examen del Papanicolau una vez al año para evitar el cáncer cervical causado por el virus del herpes genital.
- Es importante recordar que la administración de Aciclovir al paciente no evita que otras personas puedan ser contagiadas. Es preferible evitar el contacto sexual mientras uno de los dos en la pareja tenga cualquier síntoma de herpes.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos **kralvir-us®** puede presentar efectos adversos, entre ellos los más frecuentes son: dolor de cabeza, mareos, sensación de cansancio, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, prurito y erupciones cutáneas.

En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE kralvir-us®

- Si usted olvida tomar una dosis, tómelas tan pronto sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cerca, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- **kralvir-us® 800 mg tabletas recubiertas** y **kralvir-us® 200 mg /5 mL suspensión oral** pueden administrarse con o sin alimentos.
- Se recomienda mantener limpias y secas las áreas afectadas al momento de aplicar **kralvir-us® 5% crema tópica** y durante todo el día.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.
DIVISIÓN DE LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

