

Resfriolito[®]

INFANTIL

FENILEFRINA CLORHIDRATO, LORATADINA Y ACETAMINOFÉN

**descongestiona la nariz, antialérgico,
reduce la fiebre y alivia el dolor**

Jarabe

CONOCIENDO Resfriolito[®] Infantil

Resfriolito[®] Infantil es un medicamento que combina tres principios activos: la **Fenilefrina clorhidrato** ayuda a aliviar la congestión nasal, ya que contrae los vasos sanguíneos, la **Loratadina** es un antihistamínico de acción prolongada, que ayuda a aliviar el prurito, estornudos, congestión y goteo nasal, sin producir sueño y el **Acetaminofén** posee efecto analgésico (alivia el dolor) así como antipirético (reduce la fiebre).

QUÉ CONTIENE Resfriolito[®] Infantil

Cada 5 mL de jarabe contienen:

Fenilefrina HCl	1.67 mg
Loratadina	0.83 mg
Acetaminofén	150 mg
Vehículo c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO Resfriolito[®] Infantil

Resfriolito[®] Infantil jarabe es un medicamento indicado para tratar los síntomas del resfriado común, gripe y rinitis alérgica también conocido como alergia estacional: rinorrea, flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza y cuerpo.

COMO SE PRESENTA Resfriolito[®] Infantil

Resfriolito[®] Infantil jarabe se presenta en caja conteniendo un envase con 50, 60, 120 y 240 mL de jarabe, vasito dosificador y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral

La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Siga las indicaciones que le de su médico.

A continuación, la dosis promedio usual:

Dosis	
Niños de 6 a 8 años	10 mL cada 8 horas
Niños 8 a 12 años	15 mL cada 8 horas

No exceder la dosis recomendada.

ANTES DE USAR Resfriolito[®] Infantil LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** No administrar en pacientes alérgicos a alguno de los ingredientes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otra medicina o comida.
- Está contraindicado en pacientes con glaucoma ángulo estrecho, retención urinaria, hipertensión grave, enfermedad coronaria severa, hipertiroidismo, úlcera péptica, granulomatosis y diabetes mellitus.
- Los beta bloqueadores pueden aumentar los efectos vasoconstrictores de la fenilefrina.
- Inhibidores de la MAO pueden prolongar e intensificar los efectos presores de la fenilefrina.
- El uso concomitante con ketoconazol, eritromicina y cimetidina se ha reportado aumento en las concentraciones de loratadina.
- Los pacientes con función hepática alterada se debe administrar inicialmente una dosis menor, ya que estos pacientes pueden tener una depuración de loratadina más lenta.
- El Acetaminofén puede potenciar el efecto de los anticoagulantes cuando se usan dosis superiores a los 2g/día.
- No se use en menores de 2 años.

EFFECTOS NO DESEADOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, generalmente están relacionados con la dosis y la duración del tratamiento. Normalmente éstos pueden revertirse o reducirse al mínimo por medio de una reducción de la dosis lo que generalmente es preferible a la suspensión del tratamiento farmacológico.

USO ADECUADO DE Resfriolito® Infantil

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome este medicamento durante todo el tiempo del tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal.
- No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta libre

00 10220



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com