

perivan plus®

MOSAPRIDA CITRATO
DIMETILPOLISILOXANO

**regulador de la motilidad gastrointestinal,
antiflatulento**

Suspensión oral gotas

CONOCIENDO perivan plus®

perivan plus® suspensión oral gotas combina dos principios activos, Mosaprida citrato y Dimetilpolisiloxano. La Mosaprida citrato actúa estimulando la motilidad gástrica y esofágica, lo cual permite acelerar el vaciamiento gástrico y el alivio de la dispepsia no ulcerosa, gastroparesia y reflujo gastroesofágico. Por su parte, el Dimetilpolisiloxano produce el alivio de los síntomas producidos por exceso de gas en el estómago y el intestino.

QUÉ CONTIENE perivan plus®

Cada 1 mL de **perivan plus® suspensión oral gotas** contiene: Mosaprida citrato dihidrato equivalente a

Mosaprida citrato	5 mg
Dimetilpolisiloxano	80 mg
Vehículo c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO perivan plus®

perivan plus® suspensión oral gotas está indicado para el tratamiento de las siguientes molestias:

- Trastornos de la motilidad gastrointestinal
- Dispepsia no ulcerosa
- Reflujo gastroesofágico
- Gastroparesia (acelera el vaciamiento gástrico)
- Síntomas digestivos (ardor estomacal, náusea, vómito) que acompañan a la gastritis crónica
- Meteorismo (como antiflatulento eliminando gases)

CÓMO SE PRESENTA perivan plus®

perivan plus® suspensión oral gotas se presenta en caja conteniendo un envase de 30 mL (1 mL = 26 gotas) con gotero dosificador integrado que provee el tamaño de gota adecuado para su correcta dosificación, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Siga las instrucciones que le indique su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos: 1 mL (26 gotas) 3 veces al día, antes de las comidas. Agitar antes de usar.

Ancianos: 0.5 mL (13 gotas) 3 veces al día, antes de las comidas. Agitar antes de usar.

ANTES DE USAR perivan plus® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** No administrar en pacientes alérgicos a alguno de los componentes. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- **Embarazo y lactancia:** no administrar durante el embarazo y la lactancia.
- **Administrar con precaución en pacientes con función hepática o renal disminuida.** En ancianos podrá considerarse una reducción de la dosis.
- **Uso con otros medicamentos:** la administración simultánea con anticolinérgicos (sulfato de atropina, bromuro de butilscopolamina) puede disminuir la acción de Mosaprida citrato, por lo que se recomienda ampliar los intervalos de administración entre ambas medicaciones.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com