

# RESFRIOL<sup>®</sup> NF

ALIVIO DE LOS SÍNTOMAS DE  
LA GRIPE Y EL RESFRIADO

LORATADINA  
FENILEFRINA HCl  
ACETAMINOFÉN

**antihistamínico, descongestivo,  
antipirético y analgésico**

Tabletas recubiertas

## CONOCIENDO **RESFRIOL<sup>®</sup> NF**

**RESFRIOL<sup>®</sup> NF** tabletas recubiertas es un medicamento que contiene como principios activos, Loratadina, Fenilefrina HCl y Acetaminofén. La Loratadina es un antihistamínico tricíclico de acción prolongada con actividad como antagonista selectivo de los receptores H1 periféricos, que no tiene efecto sedante. La Fenilefrina HCl es un antagonista de los receptores adrenérgicos alfa-1 que ayuda a la descongestión nasal. El Acetaminofén ejerce acción antipirética al actuar sobre el centro termorregulador, produciendo pérdida de calor por vasodilatación periférica y sudación.

## QUÉ CONTIENE **RESFRIOL<sup>®</sup> NF**

Cada tableta recubierta de **RESFRIOL<sup>®</sup> NF** contiene:

Loratadina	2.5 mg
Fenilefrina HCl	5 mg
Acetaminofén	500 mg
Excipientes c.s.	

## EN QUÉ CASOS ESTA INDICADO **RESFRIOL<sup>®</sup> NF**

**RESFRIOL<sup>®</sup> NF** tabletas recubiertas está indicado para el alivio de los síntomas de la gripe y resfriado, asociados con rinitis alérgica como congestión nasal, estornudos, rinoreya, lagrimeo, prurito ocular y nasal.

## CÓMO SE PRESENTA **RESFRIOL<sup>®</sup> NF**

**RESFRIOL<sup>®</sup> NF** tabletas recubiertas se presenta en caja conteniendo 20 y 120 tabletas recubiertas con el presente inserto y dispensador de 120 tabletas.

Las tabletas recubiertas están contenidas dentro de burbujas individuales de blíster, que las protege de la humedad y de la luz ultravioleta.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presenta la dosis promedio usual:

Adultos y niños mayores de 12 años: 2 tabletas cada 12 horas.

No exceder la dosis recomendada.

## ANTES DE USAR **RESFRIOL<sup>®</sup> NF** LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** No administrar en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- No administrar a niños menores de 2 años de edad.
- La administración prolongada de Acetaminofén puede ocasionar daño hepático, por lo que no se debe administrar por más de 5 días en niños, o más de 10 en adultos por dolor, o por más de 3 días si persiste la fiebre.
- No debe administrarse en combinación con otros medicamentos que contengan Acetaminofén, antihistamínicos o descongestionantes adicionales.
- Utilizar con cautela en pacientes con glaucoma, úlcera péptica estenosante, obstrucción piloroduodenal, hipertrofia prostática y obstrucción del cuello de la vejiga, enfermedad cardiovascular, aumento de la presión intraocular y Diabetes mellitus o que estén en tratamiento con digitalicos.
- Los descongestionantes pueden estimular el sistema nervioso central causando convulsiones y colapso cardiovascular asociado con hipotensión.
- En pacientes con insuficiencia hepática debe administrarse inicialmente una dosis menor ya que estos pacientes pueden tener una depuración de Loratadina más lenta.
- No consumir bebidas alcohólicas, ni sedantes durante el tratamiento.
- Utilizar con precaución si se requiere manejo de vehículos y maquinaria pesada.
- **RESFRIOL<sup>®</sup> NF** debe administrarse con precaución y bajo supervisión médica en adultos mayores de 60 años ya que puede causar confusión, alucinaciones, crisis convulsivas, depresión del SNC e incluso hasta la muerte.

## EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, entre ellos los más comunes son:

- **Loratadina:** fatiga, cefaleas, somnolencia, boca seca, náuseas, gastritis y erupciones cutáneas.
- **Fenilefrina HCl:** náuseas, somnolencia, cefalea, debilidad, mareo, taquicardia y palpitaciones, insomnio, nerviosismo, excitabilidad, agitación y midriasis.
- **Acetaminofén:** reacciones hematológicas y erupciones cutáneas. Después de administraciones prolongadas se han reportado efectos nefrotóxicos.

## USO ADECUADO DE **RESFRIOL® NF**

- No administre más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **RESFRIOL® NF** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal.
- No duplique la dosis.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Modalidad de venta: venta libre.

KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.  
DIVISIÓN DE LABORATORIO Y DROGUERÍA  
DONOVAN WERKE A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro  
Departamento Médico en Guatemala al  
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

