

estreñiverio®

BROMURO DE PINAVERIO
DIMETILPOLISILOXANO

antiespasmódico
regulador del tránsito intestinal
antiflatulento

Cápsula de gelatina blanda

CONOCIENDO estreñiverio®

estreñiverio® es un medicamento que combina los principios activos Bromuro de pinaverio y Dimetilpolisiloxano. El Bromuro de pinaverio es un espasmolítico que ejerce selectivamente su acción sobre el tracto gastrointestinal, es un antagonista del calcio que inhibe su flujo hacia las células del músculo liso intestinal. Por otro lado, Dimetilpolisiloxano es una sustancia fisiológicamente inerte, por lo tanto, farmacológicamente inactiva, que actúa modificando la tensión superficial de las burbujas de gas, causando así su coalescencia. La combinación de estos activos es utilizada en el tratamiento de los síntomas de la colitis y síndrome del intestino irritable como antiespasmódico, regulador del tránsito intestinal y antiflatulento.

QUÉ CONTIENE estreñiverio®

Cada cápsula de gelatina blanda de **estreñiverio®** contiene:
Bromuro de pinaverio 100 mg
Dimetilpolisiloxano 300 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO estreñiverio®

- En el tratamiento de los síntomas de la colitis y síndrome de intestino irritable.
- En las disfunciones intestinales inespecíficas de la motilidad intestinal.
- Otros padecimientos funcionales asociados con meteorismo como la distensión abdominal.

CÓMO SE PRESENTA estreñiverio®

estreñiverio® cápsulas de gelatina blanda se presenta en caja de 30 cápsulas blandas, contenidas en burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presenta la dosis promedio usual:

Adultos:

Tratamiento de Síndrome de Intestino Irritable en cualquiera de sus variantes, tomar 1 cápsula dos veces al día, 10 o 15 minutos antes del almuerzo y de la cena.
Algunos casos severos o de difícil control, pueden tomar 1 cápsula tres veces al día.

ANTES DE USAR estreñiverio® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFORMELE A SU MÉDICO

- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- Pacientes con obstrucción intestinal, úlcera de estómago, úlcera duodenal o esofagitis, no se recomienda su uso.
- Es aconsejable tomar al menos 2 horas antes de otros medicamentos.
- La administración durante el embarazo y la lactancia queda exclusivamente a criterio médico.
- No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños, por lo que su uso queda exclusivamente a criterio médico.
- La administración en conjunto con anticolinérgicos puede aumentar la espasmólisis.

USO ADECUADO DE estreñiverio®

- Tome **estreñiverio®** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida administrar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- **estreñiverio®** debe tomarse con un vaso de agua.

EFFECTOS ADVERSOS

estreñiverio® así como otros medicamentos puede presentar efectos adversos, entre ellos los más frecuentes son: dolor abdominal, disfagia, prurito y rash.

Los efectos adversos normalmente desaparecen al suspender el tratamiento o bien al disminuir la dosis utilizada. En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro

Departamento Médico en Guatemala al

PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com

Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

