

herzavan®

QUETIAPINA

antipsicótico

herzavan® 25 mg tabletas recubiertas

herzavan® 100 mg tabletas recubiertas

herzavan® 200 mg tabletas recubiertas

CONOCIENDO herzavan®

herzavan® contiene como principio activo Quetiapina, un antipsicótico de segunda generación utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia, depresión mayor y trastorno bipolar. Su mecanismo de acción no se comprende completamente, por lo que existen varios mecanismos propuestos en la actualidad. En la esquizofrenia, sus acciones podrían deberse al antagonismo de los receptores de dopamina tipo 2 (D2) y serotonina 2A (5HT2A). En la depresión bipolar y la depresión mayor, las acciones de la Quetiapina pueden atribuirse a la unión de este fármaco o de su metabolito al transportador de noradrenalina. Los efectos adicionales de la Quetiapina, que incluyen somnolencia, hipotensión ortostática y efectos anticolinérgicos, pueden resultar del antagonismo de los receptores de histamina H1, los receptores adrenérgicos α 1 y los receptores muscarínicos M1, respectivamente. A largo plazo ha demostrado una alta eficacia terapéutica y un bajo riesgo de efectos adversos en comparación con otros fármacos tales como la clozapina y la olanzapina.

QUÉ CONTIENE herzavan®

Cada tableta recubierta de **herzavan® 25 mg** contiene:
Quetiapina fumarato equivalente a
Quetiapina 25 mg
Excipientes c.s.

Cada tableta recubierta de **herzavan® 100 mg** contiene:
Quetiapina fumarato equivalente a
Quetiapina 100 mg
Excipientes c.s.

Cada tableta recubierta de **herzavan® 200 mg** contiene:
Quetiapina fumarato equivalente a
Quetiapina 200 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO herzavan®

herzavan® 25 mg, 100 mg y 200 mg tabletas recubiertas están indicados para el tratamiento de:

- Esquizofrenia
- Trastorno bipolar: En episodios maníacos de moderados a grave, así como en episodios depresivos mayores, y como preventivo de episodios maníacos o depresivos en pacientes previamente tratados con Quetiapina y que han respondido al tratamiento.

CÓMO SE PRESENTA herzavan®

herzavan® 25 mg tabletas recubiertas se presentan en caja con 30 tabletas recubiertas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

herzavan® 100 mg tabletas recubiertas se presentan en caja con 30 tabletas recubiertas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

herzavan® 200 mg tabletas recubiertas se presentan en caja con 30 tabletas recubiertas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Patología	Dosis	
	Día 1	50 mg
Esquizofrenia	Día 2	100 mg
	Día 3	200 mg
	Día 4	300 mg
	Dosis de mantenimiento	200 mg 2 veces al día. La dosis se puede ajustar dentro del rango de 150 mg a 750 mg/día
	Día 1	100 mg
Episodios maníacos de moderados a graves asociados al trastorno bipolar	Día 2	200 mg
	Día 3	300 mg
	Día 4	400 mg
	Dosis de mantenimiento	La dosis efectiva habitual se encuentra entre 200 mg/día a 800 mg/día
	Día 1	50 mg
Episodios depresivos mayores asociados al trastorno bipolar	Día 2	100 mg
	Día 3	200 mg
	Día 4	300 mg
	Dosis de mantenimiento	Administrarse 1 vez al día por las noches antes de acostarse. La dosis efectiva habitual se encuentra entre 200 mg/día a 300 mg/día

En la prevención de episodios maníacos o depresivos asociados al trastorno bipolar los pacientes deben continuar el tratamiento con la dosis indicada por su médico, se recomienda una dosis entre 300 mg a 800 mg por día. Es importante que para la prevención se utilice la dosis mínima recomendada de 200 mg al día.

ANTES DE USAR herzavan® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergias: no administrar en pacientes alérgicos a la Quetiapina o a cualquier otro medicamento o comida.
- Si padece o a padecido alguna afección cardíaca como hipotensión, problemas del ritmo del corazón, si a sufrido algún accidente cerebrovascular, especialmente si tiene edad avanzada.
- Si tiene algún problema a nivel hepático, ya que se metaboliza extensamente en el hígado.
- Si sufre de demencia senil no debe tomar **herzavan®**, ya que puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, o en algunos casos provocar la muerte.
- Si padece de la enfermedad de Parkinson, ya que las altas concentraciones de Quetiapina pueden provocar síntomas extrapiramidales como el síndrome de movimientos involuntarios especialmente en las manos y piernas, síndrome de piernas inquietas agravando los síntomas propios de la enfermedad.
- Si padece de algún problema de coagulación en la sangre, ya que la Quetiapina puede aumentar la posibilidad de formar coágulos en la sangre.
- Si tiene antecedentes de abuso de drogas o alcohol.
- Si es diabético, ya que la Quetiapina puede alterar los niveles de glucosa en la sangre.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia no debe utilizar **herzavan®**, ya que puede ocasionar daños en el feto o bien síndrome de abstinencia en niños recién nacidos de madres que han utilizado Quetiapina en el último trimestre del embarazo.
- Si está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.
- Si está tomando medicamentos de tipo azol (indicados para las infecciones causadas por hongos).
- Si está tomando medicamentos para el VIH ó antibióticos como claritromicina o eritromicina, ya que interfieren en la eficacia de la Quetiapina.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos, se pueden presentar efectos adversos, entre ellos los más frecuentes son: mareos, dolor de cabeza, boca seca, sensación de somnolencia, aumento de peso, por lo que su peso debe ser monitoreado y controlado por un experto. Movimientos musculares anormales como lo son temblores, dificultad para iniciar la marcha, sensación de inquietud o rigidez muscular sin dolor. Cambio en los niveles de colesterol total y triglicéridos en la sangre. Aumento de los niveles de azúcar en la sangre, visión borrosa, sueños y pensamientos suicidas, aumento de la hormona prolactina en la sangre, lo que conlleva tanto a hombres y mujeres a tener hinchazón en las mamas y la producción de leche inesperada.

USO ADECUADO DE herzavan®

- Tome **herzavan®** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida administrar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- Si deja de tomar **herzavan®** debe realizarlo bajo la supervisión del médico en un lapso de 1 a 2 semanas, ya que puede ocasionar síntomas de interrupción (insomnio, náuseas, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, mareos e irritabilidad).
- No tomar jugo de toronja mientras toma **herzavan®**, ya que afecta la forma de actuar del medicamento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
farmacovigilancia.gt@gmail.com farmacovigilancia@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

