

# alkrazil®

ALPRAZOLAM

**tranquilizante  
ansiolítico**

Tabletas

## CONOCIENDO alkrazil®

alkrazil® contiene como principio activo el Alprazolam que es una benzodiazepina oral para el tratamiento de los desórdenes de ansiedad.

## QUÉ CONTIENE alkrazil®

### alkrazil® 0.5 mg tabletas

Cada tableta contiene:

Alprazolam 0.5 mg

Excipientes c.s.

### alkrazil® 1 mg tabletas

Cada tableta contiene:

Alprazolam 1 mg

Excipientes c.s.

## EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO alkrazil®

alkrazil® está indicado para el tratamiento del estado de ansiedad que comprende los siguientes síntomas:

- Ansiedad
- Tensión
- Opresión
- Irritabilidad
- Insomnio
- Aprensión
- Hiperactividad autonómica

También está indicado su uso en el tratamiento de los estados de ansiedad simple y asociada a otros padecimientos como en la fase crónica de abstinencia alcohólica, desórdenes gastrointestinales, cardiovasculares y padecimientos dermatológicos.

## CÓMO SE PRESENTA alkrazil®

alkrazil® 0.5 mg tabletas se presenta en caja conteniendo 30 tabletas dentro de burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.



alkrazil® 1 mg tabletas se presenta en caja conteniendo 40 tabletas dentro de burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis de **alkrazil®** es individual dependiendo de la sintomatología y la respuesta del paciente. En pacientes adultos se puede iniciar con 0.5 mg tres veces al día. Puede oscilar entre 0.5 mg a 4 mg al día, dividida en varias tomas.

En pacientes geriátricos o debilitados el tratamiento puede oscilar entre 0.5 mg a 0.75 mg al día dividido en varias tomas.



Se recomienda que en general se use la dosis efectiva mas baja para evitar el desarrollo de sedación excesiva o ataxia. Se debe reevaluar a los pacientes periódicamente y hacer ajustes de dosis necesarios.

## PRECAUCIONES

- La dosis de **alkrazil®** debe ser reducida gradualmente para evitar que se presenten convulsiones.
- En pacientes geriátricos o debilitados, se debe utilizar la dosis más baja con el fin de evitar una ataxia o una sobredosificación.
- **Este medicamento puede provocar dependencia.**
- Se debe tener especial cuidado al prescribir benzodiazepinas a pacientes con tendencia al abuso de drogas, tales como alcohólicos y drogadictos, debido a su predisposición al hábito y dependencia.
- Han aparecido síntomas de abstinencia después de la disminución rápida o supresión abrupta de benzodiazepinas incluyendo alprazolam, por lo tanto, la dosis debe ser reducida gradualmente para evitar síntomas por una supresión rápida.
- El alprazolam debe ser empleado con suma precaución en pacientes con depresión respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) o apnea del sueño ya que puede exacerbar la insuficiencia respiratoria.
- No se ha establecido la seguridad y eficacia de alprazolam en menores de 18 años.
- No se recomienda utilizar Alprazolam durante el embarazo ni tampoco durante la lactancia, salvo que, a criterio médico, el beneficio supere el riesgo.

alkrazil® debe administrarse con precaución en pacientes que operen maquinaria o que manejen vehículos automotores, porque puede causar somnolencia o mareos.

## CONTRAINDICACIONES

El Alprazolam está contraindicado en: pacientes sensibles a las benzodiazepinas, pacientes que presenten glaucoma de ángulo estrecho, en embarazo y en miastenia gravis.

Se recomienda suspender la lactancia mientras se usa el medicamento.

Durante el tratamiento con **alkrazil®** se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas. El efecto del alcohol puede potenciar la sedación, y esto puede afectar el estado de alerta.

## EFECTOS NO DESEADOS

Con el uso de Alprazolam se puede presentar somnolencia, y ocasionalmente visión borrosa, incoordinación y síntomas gastrointestinales.

La sobredosis con benzodiazepinas se manifiesta generalmente por distintos grados de depresión del sistema nervioso central, que pueden ir desde somnolencia hasta coma.

## INTERACCIONES

**alkrazil**<sup>®</sup> puede interactuar con otros medicamentos tales como:

- Depresores del sistema nervioso central, ya que pueden potenciar el efecto sedante.
- Tranquilizantes mayores (antipsicóticos).
- Inductores del sueño (hipnóticos).
- Medicamentos usados para tratar la depresión.
- Medicamentos para el tratamiento de la epilepsia (antiepilépticos).
- Analgésicos narcóticos (derivados de la morfina), debido a que pueden aumentar la sensación de euforia, lo que puede llevar a aumentar la dependencia psíquica.
- Medicamentos usados para el tratamiento de la ansiedad (ansiolíticos/sedantes).
- Anestésicos - Antihistamínicos (medicamentos para tratar alergias) sedantes.

Hay algunos grupos de medicamentos que por su acción en el organismo (inhibidores del citocromo P450) pueden interactuar con **alkrazil**<sup>®</sup> y en algunos casos pueden aumentar su actividad. Algunos de estos son:


- Medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones por hongos como ketoconazol, itraconazol, posaconazol o voriconazol.
- Protectores gástricos como la cimetidina.
- Diltiazem (antihipertensivo).
- Antibióticos macrólidos como eritromicina, troleandomicina, claritromicina y telitromicina.
- Digoxina (medicamento utilizado para suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo del corazón).

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica y bajo receta retenida.

KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.   
DIVISIÓN DE LABORATORIO Y DROGUERÍA  
DONOVAN WERKE A.G.S.A.

Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro  
Departamento Médico en Guatemala al  
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

