

# closteder<sup>®</sup>

CLOSTEBOL ACETATO  
NEOMICINA SULFATO

## **cicatrizante - antibiótico**

- Crema tópica
- Suspensión en aerosol

### **CONOCIENDO closteder<sup>®</sup>**

**closteder<sup>®</sup>** asociación de un esteroide anabólico y un antibiótico de uso tópico. El Clostebol acetato ejerce una acción cicatrizante, acortando el período de reparación de las lesiones cutáneas y mucocutáneas. También contiene en su composición Neomicina que actúa sobre el componente infeccioso, evitando el efecto de este en el retraso del período de cicatrización de las heridas.

La suspensión en aerosol por su formulación anhidra está especialmente indicada en úlceras tóxicas (del diabético), llagas por decúbito y quemaduras. Ejerce una acción cicatrizante de las lesiones de la piel, acortando el período de reparación, además tiene una acción bactericida sobre bacterias oportunistas que infectan las heridas y que son sensibles a la Neomicina.

### **QUÉ CONTIENE closteder<sup>®</sup>**

#### **closteder<sup>®</sup> crema tópica**

Cada 100 gramos de crema contienen:

Clostebol acetato 500 mg

Neomicina base 350 mg

(en forma de sulfato)

Vehículo c.s.

#### **closteder<sup>®</sup> suspensión en aerosol**

Cada envase contiene:

Clostebol acetato 300 mg

Neomicina sulfato 300 mg

Vehículo y propelente c.s.

### **EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO closteder<sup>®</sup>**

**closteder<sup>®</sup>** está indicado para el tratamiento de las abrasiones y erosiones de la piel, úlceras por várices, traumáticas y por decúbito, dermatosis erosivas de la piel y de las mucosas (piodermatitis, impétigo, intertrigo, pénfigo); grietas del pezón y de las comisuras labiales, quemaduras, heridas infectadas, retraso de la cicatrización, radiodermatitis, estados distróficos cutáneos (sequedad, fisuración, descamación).

### **CÓMO SE PRESENTA closteder<sup>®</sup>**

**closteder<sup>®</sup> crema tópica** se presenta en caja con tubo conteniendo 50 gramos de crema y el presente inserto.

**closteder<sup>®</sup> suspensión en aerosol** se presenta en caja con envase aerosol conteniendo 50 mL y 60 mL y el presente inserto.

### **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**

Vía de administración tópica.

**closteder<sup>®</sup> crema tópica** aplicar una capa delgada una o dos veces al día sobre el área afectada.

**closteder<sup>®</sup> suspensión en aerosol** aplicar una o dos veces al día sobre el área afectada.

### **ANTES DE USAR closteder<sup>®</sup> LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO**

- Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.
- Evitar el uso prolongado de **closteder<sup>®</sup>** especialmente en superficies lesionadas extensas que puedan permitir la absorción de la Neomicina.
- Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal.

### **CONTRAINDICACIONES**

- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- No administrar en caso de infección mamaria y en el período de lactancia, debido al riesgo de ingestión por el recién nacido.

### **ADVERTENCIA**

**closteder<sup>®</sup> suspensión en aerosol:** Envase bajo presión. Inflamable. Evitar su uso cerca del fuego. Conservar en un lugar fresco y proteger de la luz del sol. No golpear, perforar o quemar el envase aún después de haberse terminado el contenido. Usar verticalmente durante su aplicación. Evitar la inhalación directa y el rocío en ojos y mucosas.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

