

# compleben®

COMPLEJO VITAMÍNICO "B"

## reconstituyente - antianémico

Solución inyectable

### CONOCIENDO compleben®

**compleben® solución inyectable** contiene Vitaminas del complejo "B", las cuales participan en varias reacciones esenciales del metabolismo; por lo que actúa como reconstituyente mejorando el estado general y la recuperación de personas con fatiga o convalecientes. También dichas vitaminas intervienen en reacciones enzimáticas de la producción de sangre, por lo que produce mejoría en pacientes con anemia.

### QUÉ CONTIENE compleben®

Cada 1 mL de **compleben® solución inyectable** contiene:

Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato)	50 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato)	50 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	300 mcg
Nicotinamida	50 mg
Vehículo c.s.	

### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO compleben®

**compleben® solución inyectable** está indicado para el tratamiento de:

- Anemia por carencia de vitaminas del complejo B debido a una alimentación deficiente.
- Coadyuvante en el tratamiento con preparados de hierro en casos de anemia ferropénica (por deficiencia de hierro).
- Deficiencia de vitaminas del complejo B por carencia nutricional relacionado con el consumo de alcohol, produciendo protección a la célula nerviosa y reducción de los síntomas de neuritis.
- Deficiencia de vitaminas del complejo B manifestada en casos de insuficiencia renal o nutrición parenteral.
- En niños y adultos **compleben® solución inyectable** ha mejorado el apetito, dando lugar a un buen peso corporal.

### CÓMO SE PRESENTA compleben®

**compleben® solución inyectable presentación de 10 mL** se presenta en caja con vial de vidrio ámbar de 10 mL contenido dentro de blíster y el presente inserto o acompañado de 5 jeringas descartables, 5 toallitas con alcohol, y el presente inserto.

**compleben® solución inyectable presentación de 16 mL** se presenta en caja con vial de vidrio ámbar de 16 mL, 8 jeringas descartables, 8 toallitas con alcohol, y el presente inserto.

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración intramuscular.

La dosis puede variar según sea el caso. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

- Adultos: 2 mL vía intramuscular en días alternos.
- Niños: 1 mL vía intramuscular en días alternos o a criterio médico.

### ANTES DE USAR compleben® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: infórmele a su médico si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o alimento.
- Por contener alcohol bencílico, no administrar en niños menores de 6 meses.
- No se presentan contraindicaciones a dosis recomendadas.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)

Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

