
dexadon®

LORATADINA
DEXAMETASONA

**antihistamínico - antialérgico
antiinflamatorio**

tabletas

CONOCIENDO dexadon®

dexadon® tabletas es un medicamento que combina la acción antihistamínica de la Loratadina con la antiinflamatoria de la Dexametasona; logrando así una enérgica acción terapéutica frente a las reacciones alérgicas en general, sobre todo en las que por su severidad necesitan de esta combinación para dar un efecto inmediato y sostenido.

QUÉ CONTIENE dexadon®

Cada tableta de **dexadon®** contiene:
Loratadina 10 mg
Dexametasona 2 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO dexadon®

dexadon® tabletas está indicado para reacciones alérgicas agudas o crónicas que por la importancia de sus síntomas o por no haber sido controlados con Loratadina sola, requieren de un tratamiento combinado con un antiinflamatorio (Dexametasona), como en los casos de:

- Rinitis estacional
- Conjuntivitis alérgica
- Rinofaringitis alérgica
- Laringotraqueobronquitis
- Fiebre del heno
- Alergia a medicamentos o alimentos
- Rosácea
- Urticaria
- Eccema de contacto
- Dermatitis atópica
- Dermatitis exfoliativa

CÓMO SE PRESENTA dexadon®

dexadon® tabletas se presenta en caja con 15 tabletas contenidas en burbujas de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

En adultos y niños mayores de 12 años: 1 tableta al día.
Tomar preferiblemente por la mañana y con las comidas.

ANTES DE USAR dexadon® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier medicina o comida o a cualquier otro medicamento o comida
- En pacientes con insuficiencia hepática debe administrarse inicialmente una dosis menor, ya que estos pacientes pueden tener una depuración de Loratadina más baja.
- No se recomienda su uso en embarazo y lactancia, ni en niños menores de 2 años.
- Su uso y dosificación en los siguientes casos debe ser exclusivamente bajo indicación y supervisión del médico y dependerá que el beneficio del paciente sea mayor que cualquier posible riesgo: pacientes bajo tratamiento de inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) o dentro de 14 días de haber suspendido su administración y en pacientes con glaucoma, retención urinaria, hipertensión, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), infección con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), anastomosis intestinal, enfermedad cardíaca, infarto del miocardio, fallo del corazón congestivo, insuficiencia renal o hepática severa, varicela, sarampión, esofagitis, gastritis o úlcera péptica, diabetes mellitus, hipotiroidismo, herpes simplex ocular, hipoalbuminemia, infección viral o bacteriana, miastenia gravis, osteoporosis, psicosis aguda y tuberculosis.
- No se recomienda administrar en infecciones fúngicas sistémicas.
- La administración en pacientes mayores de 65 años debe ser sólo bajo indicación y supervisión médica, debido a que estos pacientes son más sensibles a los efectos secundarios anticolinérgicos (sequedad de boca, retención urinaria) del medicamento. Si aparecen estos efectos colaterales, puede ser necesaria la suspensión del mismo. También se debe tener precaución en estos pacientes por el alto riesgo de desarrollar osteoporosis (especialmente en las mujeres post menopáusicas) o hipertensión.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

En el caso de la Loratadina el uso concomitante con ketoconazol, eritromicina o cimetidina, puede resultar en un aumento de las concentraciones plasmáticas de la Loratadina sin tener cambios clínicos significativos.

Por su parte la Dexametasona presenta interacciones con los siguientes medicamentos:

- Antiácidos.
- Antiinflamatorios no esteroideos y alcohol, al producir el aumento del riesgo de úlcera.
- Mineralocorticoides: hay aumento del riesgo de hipertensión, edema y afecciones cardíacas.
- Antidiabéticos orales (glibenclamida, metformina): se debe ajustar la terapia diabética.
- Salicilatos: ácido acetilsalicílico y difunisal.
- Antiepilépticos (carbamacepina, fenitoína).
- Otras interacciones: con ciertos antibióticos, estrógenos, efedrina, ciclosporina, teofilina, rifampicina, isoniazida, vacunas, toxoides y digoxina.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más comunes son:

- Somnolencia
- Dolor de cabeza
- Nerviosismo
- Aumento del apetito
- Problemas de sueño
- Sequedad de boca, nariz y garganta
- Fatiga
- Irritación gastrointestinal
- Indigestión
- Aumento de peso

USO ADECUADO DE dexadon®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome este medicamento durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible; sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal.
- No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz ultravioleta y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

