

---

---

---

---

---

---

# dexilopram<sup>®</sup>

ESCITALOPRAM

## antidepresivo

dexilopram<sup>®</sup> 10 mg tabletas recubiertas

dexilopram<sup>®</sup> 20 mg tabletas recubiertas

### CONOCIENDO dexilopram<sup>®</sup>

**dexilopram<sup>®</sup>** es un medicamento que contiene como principio activo Escitalopram, el cual es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) y el enantiómero S del citalopram racémico. Se utiliza para restaurar la función serotoninérgica en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, ya que aumenta los niveles de serotonina en el cerebro. Entre los ISRS, el Escitalopram ejerce el mayor grado de selectividad por el transportador de serotonina en relación con otros, lo que explica los bajos efectos adversos en comparación con otros agentes de esta clase.

### QUÉ CONTIENE dexilopram<sup>®</sup>

#### **dexilopram<sup>®</sup> 10 mg tabletas recubiertas**

Cada tableta recubierta contiene:

Escitalopram oxalato	12.78 mg
equivalente a Escitalopram	10.00 mg
Excipientes c.s.	

#### **dexilopram<sup>®</sup> 20 mg tabletas recubiertas**

Cada tableta recubierta contiene:

Escitalopram oxalato	25.56 mg
equivalente a Escitalopram	20.00 mg
Excipientes c.s.	

### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO dexilopram<sup>®</sup>

**dexilopram<sup>®</sup>** está indicado para el tratamiento de:

- Episodios depresivos mayores.
- Trastorno de pánico con o sin agorafobia.
- Trastorno de ansiedad social.
- Trastorno de ansiedad generalizada.
- Trastorno obsesivo-compulsivo.

### CÓMO SE PRESENTA dexilopram<sup>®</sup>

**dexilopram<sup>®</sup> 10 mg tabletas recubiertas** y **dexilopram<sup>®</sup> 20 mg tabletas recubiertas** se presentan en caja con 30 tabletas recubiertas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes,

siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

- **Episodios depresivos mayores:** la dosis habitual es de 10 mg al día. La dosis puede aumentarse hasta 20 mg al día dependiendo la respuesta individual del paciente.
- **Trastorno de pánico con o sin agorafobia:** se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis única de 5 mg diarios durante la primera semana, dependiendo la respuesta del paciente se puede aumentar la dosis a 10 mg al día. La dosis máxima diaria es de 20 mg por día según la respuesta individual del paciente. La máxima eficacia en el tratamiento de los trastornos de pánico se alcanza al cabo de 3 meses de tratamiento aproximadamente. Por lo que es un tratamiento prolongado.
- **Trastorno de ansiedad social:** la dosis habitual es de 10 mg al día, la dosis diaria puede aumentar hasta 20 mg al día según la respuesta individual del paciente. Generalmente, se observan síntomas de alivio a las 2-4 semanas de tratamiento durante por lo menos 12 semanas para consolidar la respuesta.
- **Trastorno de ansiedad generalizada:** la dosis habitual es de 10 mg al día, la dosis diaria puede aumentar hasta 20 mg al día según la respuesta individual del paciente. Se recomienda continuar con el tratamiento por lo menos 12 semanas para consolidar la respuesta al tratamiento. El tratamiento a largo plazo durante 6 meses ha mostrado prevenir las recaídas, el beneficio del tratamiento debe re-evaluarse a intervalos regulares.
- **Trastorno obsesivo-compulsivo:** la dosis habitual es de 10 mg al día, la dosis diaria puede aumentar hasta 20 mg al día, según la respuesta individual del paciente.

### ANTES DE USAR dexilopram<sup>®</sup> LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergias: infórmele a su médico si es alérgico a Escitalopram o a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- Si padece epilepsia ya que el tratamiento con escitalopram deberá interrumpirse si se produce convulsiones o si se observa un incremento en la frecuencia de las mismas.
- Diabetes, el Escitalopram puede alterar el control glucémico, en ese caso podría ser necesario un ajuste de la dosis de insulina o el hipoglucemiante oral que se administre.
- Algún problema cardíaco como bradicardia o taquicardia o si ha padecido recientemente un infarto cardíaco.
- Osteoporosis ya que el tratamiento con Escitalopram aumenta la posibilidad de sufrir fracturas de muñeca, cadera o columna vertebral.
- Enfermedad maniaco-depresiva ya que algunos pacientes pueden desarrollar una fase maniaca severa.

- La administración durante el embarazo y lactancia queda exclusivamente a criterio del médico. Ya que no se ha establecido la seguridad de Escitalopram en dichos casos.
- Si está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica como lo son: litio, warfarina, fármacos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, inhibidores de la bomba de protones como lansoprazol y omeprazol, inhibidores de la monoamino-oxidasa irreversibles no selectivos ya que se han notificado reacciones graves en pacientes que los combinan con Escitalopram.

## EFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, entre ellos los más frecuentes son:

- Sinusitis.
- Disminución o incremento del apetito.
- Ansiedad, agitación, sueños anormales, dificultad para conciliar el sueño, sentirse dormido, mareos, bostezos, temblores, picor y ardor en la piel.
- Diarrea, estreñimiento, vómito, sequedad de boca.
- Aumento de la sudoración.
- Dolores musculares y articulares.
- Alteraciones sexuales como retraso en la eyaculación, problemas de erección, disminución de la conducta sexual, en el caso de las mujeres pueden experimentar dificultad para alcanzar el orgasmo.
- Convulsiones.

## USO ADECUADO DE dexilopram®

- Tome **dexilopram®** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida administrar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com) [farmacovigilancia.gt@gmail.com](mailto:farmacovigilancia.gt@gmail.com) [farmacovigilancia@donovanwerke.com](mailto:farmacovigilancia@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)