

donoflat®

ENZIMAS DIGESTIVAS,
MOSAPRIDA CITRATO
Y SIMETICONA

Plus

- **Enzimático digestivo**
- **Regulador de la motilidad gastrointestinal**
- **Antiflatulento**

Tabletas con recubrimiento entérico

CONOCIENDO donoflat® Plus

donoflat® Plus tabletas con recubrimiento entérico es un medicamento multiacción que combina 3 componentes: la Mosaprida citrato como agente que ayuda a la motilidad gastrointestinal y tiene una acción aceleradora de la evacuación gástrica, mientras que la presencia de las Enzimas digestivas: proteasa, amilasa y lipasa, promueven la digestión eficaz de proteínas, glúcidos y lípidos, respectivamente; y por último la Simeticona, ayuda a la reducción del gas gastrointestinal por su propiedad de disminuir la tensión superficial de las burbujas de gas.

QUÉ CONTIENE donoflat® Plus

Cada tableta con recubrimiento entérico de **donoflat® Plus** contiene:

COMPOSICIÓN

ACCIÓN

Proteasa 30,000 U.....	Mejora la digestión de las proteínas
Lipasa 8,000 U.....	Mejora la digestión de las grasas
Amilasa 30,000 U.....	Mejora la digestión de los azúcares
Mosaprida citrato dihidrato equivalente a Mosaprida citrato 5 mg.....	Regula la motilidad gastrointestinal
Simeticona 60 mg.....	Disminuye los gases digestivos
Excipientes c.s.	


EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donoflat® Plus
donoflat® Plus tabletas con recubrimiento entérico está indicado para el tratamiento y alivio de síntomas leves a moderados, asociados con desórdenes gastrointestinales como: indigestión, acidez estomacal, ardores, reflujo gastroesofágico, constipación, dispepsia y flatulencia; algunos de los cuales acompañan la gastritis crónica. También para el tratamiento de dispepsia no ulcerosa y distensión postprandial.

CÓMO SE PRESENTA donoflat® Plus

donoflat® Plus tabletas con recubrimiento entérico se presenta en caja conteniendo 30 tabletas con recubrimiento entérico y el presente inserto, en dispensador de 120 tabletas con recubrimiento entérico, las cuales se encuentran contenidas en 12 sobres, cada uno de 10 tabletas con recubrimiento entérico.

Las tabletas con recubrimiento entérico están contenidas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

	Adultos: 2 tabletas con recubrimiento entérico antes de cada comida.	Mayores de 65 años: Según criterio médico.

Vía de administración oral.

Las tabletas deben ser ingeridas enteras, sin masticar, partir o deshacer.
La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico.

ANTES DE USAR donoflat® Plus LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** contiene Tartrazina, no administrar a personas alérgicas a la Tartrazina.
No administrar en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- No administrar durante el embarazo y la lactancia.
- No administrar en niños, debido a que no se ha comprobado su seguridad y eficacia.
- Administrar con precaución en pacientes con función hepática o renal disminuida.

INTERACCIONES

La administración simultánea con anticolinérgicos (sulfato de atropina, bromuro de butilescolpolamina) puede disminuir la acción de Mosaprida citrato, por lo que se recomienda ampliar los intervalos de administración entre ambas medicaciones.

EFFECTOS ADVERSOS

Puede ocurrir: diarrea, heces blandas, sequedad de boca, dolor abdominal o palpitaciones. Puede haber aumento de transaminasas hepáticas, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transferasa (GGT). Otros efectos adversos de incidencia rara son: astenia, mareos, vértigos, eosinofilia o aumento de grasas neutras.

En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE donoflat® Plus

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómla tan pronto sea posible. Sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

