

# donolip®

CIPROFIBRATO

**reductor de lípidos**

Tabletas recubiertas

## CONOCIENDO donolip®

**donolip® tabletas recubiertas** contiene como principio activo Ciprofibrato, el cual es un reductor de lípidos, que disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol y es un coadyuvante a la dieta y a otros tratamientos no farmacológicos como el ejercicio y la disminución de peso.

## QUÉ CONTIENE donolip®

Cada tableta recubierta de **donolip®** contiene:  
Ciprofibrato 100 mg  
Excipientes c.s.

## EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donolip®

**donolip® tabletas recubiertas** está indicado para disminuir la producción de colesterol LDL (colesterol malo) y aumentar los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno). Disminuye la producción y aumenta el desdoblamiento de los triglicéridos. Reduce el riesgo de que las grasas se depositen en los vasos principales del corazón y que por lo tanto se desencadene un ataque al corazón.

## CÓMO SE PRESENTA donolip®

**donolip® tabletas recubiertas** se presenta en caja de 10 y 30 tabletas recubiertas, contenidas en burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y la luz ultravioleta, y el presente inserto.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes. Siga las instrucciones que le dé su médico.

A continuación se presenta la dosis promedio usual:

DOSIS	ADULTOS Y ANCIANOS
○	1 tableta recubierta al día

Dosis máxima: 2 tabletas recubiertas al día, si es muy necesario.

En personas con función renal disminuida se recomienda 1 tableta recubierta de 100 mg cada 2 días.

## ANTES DE USAR donolip® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergias: No administrarse en pacientes alérgicos a los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si es alérgico a cualquier otro medicamento o alimento.
- No se recomienda su uso en niños debido a que la tolerancia y eficacia de **donolip® tabletas recubiertas** no ha sido establecida.
- Utilizar en embarazo y lactancia exclusivamente bajo indicación y supervisión del médico.
- No administrar a pacientes con alteraciones graves de la función renal o hepática.
- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática y síndrome nefrótico. Se recomienda practicar las pruebas periódicas de función hepática.

## USO ADECUADO DE donolip®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **donolip® tabletas recubiertas** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com).  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

