

donorup[®]

RUPATADINA

antihistamínico

Comprimidos

CONOCIENDO donorup[®]

donorup[®] comprimidos es un antihistamínico no sedante, selectivo y de acción prolongada, indicado para el alivio de los síntomas de la rinitis alérgica y de los síntomas asociados a la urticaria idiopática.

QUÉ CONTIENE donorup[®]

donorup[®] comprimidos

Cada comprimido contiene:

Rupatadina fumarato equivalente a

10 mg de Rupatadina base

Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donorup[®]

donorup[®] comprimidos está indicado para el tratamiento sintomático de:

- Rinitis alérgica: estornudos, rinorrea, lagrimeo, picor de ojos, nariz y garganta.
- Urticaria crónica idiopática: erupción y eritema cutáneo con prurito intenso.

CÓMO SE PRESENTA donorup[®]

donorup[®] comprimidos se presenta en caja con 10, 15 y 30 comprimidos contenidos en burbujas de blíster que los protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes. Siga las instrucciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos y adolescentes mayores de 12 años

La dosis recomendada es de 10 mg (un comprimido) una vez al día, con o sin alimentos.

Ancianos

Debe utilizarse con precaución en pacientes ancianos, aunque no es necesario ajustar la dosis de 10 mg.

Ingerir el medicamento con una cantidad suficiente de líquido. El médico indicará la duración de su tratamiento.

ANTES DE USAR donorup[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: no administrar en pacientes alérgicos a la Rupatadina o a alguno de los componentes de la fórmula, infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- Se debe tener especial cuidado si se padece de insuficiencia renal o hepática.
- No se debe tomar **donorup[®] comprimidos** en combinación con jugo de toronja, porque puede aumentar el nivel de Rupatadina en el organismo.
- Se debe utilizar con precaución en ancianos. Pacientes mayores de 65 años deben consultar con su médico antes de tomar **donorup[®] comprimidos**.
- Infórmele a su médico si está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
- Cuando tome **donorup[®] comprimidos**, no utilice medicamentos que contengan ketoconazol o eritromicina.
- Si está tomando depresores del sistema nervioso central o estatinas, consulte con su médico.
- La Rupatadina debe utilizarse con precaución en pacientes con prolongación del intervalo QT, hipocaliemia; así como en pacientes con condiciones pro-arrítmicas tales como bradicardia clínicamente relevante o isquemia miocárdica aguda.
- Embarazo y lactancia: no utilice **donorup[®] comprimidos** en el embarazo o lactancia.
- Conducción y uso de máquinas: no se espera que a la dosis recomendada de **donorup[®] comprimidos** tenga un efecto sobre su capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. No obstante, cuando lo utilice por primera vez, deberá tener la precaución de ver cómo puede afectarle el tratamiento antes de conducir o utilizar máquinas.

EFFECTOS NO DESEADOS

donorup® comprimidos es un medicamento bien tolerado, siendo los efectos adversos reportados, usualmente leves y pasajeros, más frecuentes:

- Somnolencia
- Dolor de cabeza
- Vértigo
- Sequedad de la boca
- Sensación de debilidad y fatiga

USO ADECUADO DE donorup®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **donorup® comprimidos** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible; sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal.
- No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

COD. 53136

0050521

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com