

# donosartán<sup>®</sup> HCT

CANDESARTÁN CILEXETILO  
HIDROCLOROTIAZIDA

**antihipertensivo**

Comprimidos recubiertos

**CONOCIENDO donosartán<sup>®</sup> HCT donosartán<sup>®</sup> HCT comprimidos recubiertos** está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial (presión alta) en pacientes adultos, cuya presión sanguínea no logra controlarse en monoterapia con: Candesartán cilexetilo solo o Hidroclorotiazida sola. Su efecto máximo se alcanza a las cuatro semanas de tratamiento, produce una reducción dosis dependiente de larga duración.

**donosartán<sup>®</sup> HCT comprimidos recubiertos** contiene dos principios activos, **Candesartán cilexetilo** e **Hidroclorotiazida**. Candesartán cilexetilo es un antagonista oral de los receptores de la Angiotensina II, este fármaco puede usarse también en pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA. Se usa en el tratamiento de la presión arterial elevada en pacientes adultos. El Candesartán hace que los vasos sanguíneos se relajen y se dilaten provocando la disminución de la presión arterial.

La Hidroclorotiazida es un diurético tiazídico que favorece la excreción urinaria de agua y sodio en la orina, lo que permite la reducción de la presión arterial.

**QUÉ CONTIENE donosartán<sup>®</sup> HCT 16 mg/12.5 mg**  
Cada comprimido recubierto de **donosartán<sup>®</sup> HCT 16 mg/12.5 mg** contiene:  
Candesartán cilexetilo 16 mg  
Hidroclorotiazida 12.5 mg  
Excipientes c.s.

**QUÉ CONTIENE donosartán<sup>®</sup> HCT 32 mg/12.5 mg**  
Cada comprimido recubierto de **donosartán<sup>®</sup> HCT 32 mg/12.5 mg** contiene:  
Candesartán cilexetilo 32 mg  
Hidroclorotiazida 12.5 mg  
Excipientes c.s.

**QUÉ CONTIENE donosartán<sup>®</sup> HCT 32 mg/25 mg**  
Cada comprimido recubierto de **donosartán<sup>®</sup> HCT 32 mg/25 mg** contiene:  
Candesartán cilexetilo 32 mg  
Hidroclorotiazida 25 mg  
Excipientes c.s.

**EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donosartán<sup>®</sup> HCT donosartán<sup>®</sup> HCT comprimidos recubiertos** se indica en la hipertensión arterial cuando la monoterapia con Candesartán cilexetilo o Hidroclorotiazida no es suficiente.

**CÓMO SE PRESENTA donosartán<sup>®</sup> HCT donosartán<sup>®</sup> HCT 16 mg/12.5 mg, donosartán<sup>®</sup> HCT 32 mg/12.5 mg y donosartán<sup>®</sup> HCT 32 mg/25 mg** se presentan en caja con 15 comprimidos recubiertos, en blister de foil de aluminio/aluminio que los protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN**  
Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Siga las instrucciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

Para el tratamiento de la hipertensión arterial **donosartán<sup>®</sup> HCT comprimidos recubiertos** debe ser administrado una vez al día con o sin alimentos, siempre a la misma hora todos los días. Se debe iniciar con un comprimido recubierto de **donosartán<sup>®</sup> HCT 16 mg/12.5 mg** y luego a las 4 semanas, cuando se considere establecido el efecto antihipertensivo, decidir si se debe ajustar a otra presentación. La elección de la dosis inicial se debe ajustar preferentemente a la dosis que venía recibiendo con estos dos principios activos en monoterapia (Candesartán cilexetilo e Hidroclorotiazida).

Tome el comprimido con un vaso de agua.

La mayor parte del efecto antihipertensivo se alcanza normalmente dentro de las primeras cuatro semanas desde el inicio del tratamiento.

DOSIFICACIÓN	ADULTOS Y ANCIANOS
	1 Comprimido al día.

**ANTES DE USAR donosartán<sup>®</sup> HCT LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO**

No se recomienda su uso si presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Si es alérgico a los principios activos del comprimido.
- Si es alérgico a las sulfonamidas.
- Si tiene enfermedad grave del riñón o del hígado.

- Si tiene niveles altos de calcio en sangre.
- Si tiene alteraciones de potasio en sangre.
- Si tiene diabetes o insuficiencia renal y está tomando aliskerén.
- Si tiene Gota o ha padecido de esta enfermedad.
- Si está embarazada o está dando lactancia materna.

Consulte a su médico antes de tomar **donosartán® HCT comprimidos recubiertos** si presenta alguno de los siguientes casos:

- Si tiene vómitos y/o diarrea.
- Si tiene problemas de la glándula suprarrenal.
- Si alguna vez ha tenido ictus.
- Si ha padecido de asma o alergia.
- Si está tomando algún tratamiento para reducir la hipertensión arterial, como los inhibidores de la ECA (enalapril, captopril, lisinopril o ramipril).
- Si ha tenido problemas de riñón relacionados con la diabetes.
- Si va a someterse a alguna cirugía.
- Si toma alguno de los siguientes tratamientos: calcio, medicamentos para reducir el colesterol, antiarrítmicos, heparina, diuréticos, penicilina, Litio, prednisona, barbitúricos, ACTH, penicilina y laxantes.
- Si tiene la impresión que el efecto es muy fuerte o muy débil, comuníquelo a su médico.

#### EFFECTOS ADVERSOS

**donosartán® HCT** así como otros medicamentos puede presentar otros efectos adversos como:

- Hiperkalemia.
- Hiponatremia.
- Incremento de creatinina, urea y potasio en pruebas renales.
- Erupciones cutáneas, urticaria o prurito.
- Tos.
- Mareos.
- Dolor de espalda.

#### COMUNICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en los descritos en esta información. También puede comunicarlos directamente a través del Programa de Farmacovigilancia de Medicamentos. Gracias a la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Datos de contactos:

[farmacovigilancia.gt@gmail.com](mailto:farmacovigilancia.gt@gmail.com)

[farmacovigilancia@donovanwerke.com](mailto:farmacovigilancia@donovanwerke.com)

#### USO ADECUADO DE donosartán® HCT

- No mezclar con alcohol, porque puede experimentar desmayos o mareos.
- No combinar con AINEs, particularmente Ácido acetilsalicílico.

- Su médico le indicará la duración de su tratamiento.
- No suspenda el tratamiento si el médico no lo indica.
- Si usted olvida una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- **Solo se debe usar en adultos.**
- Si está tomando **donosartán® HCT comprimidos recubiertos** podría dar positivo en pruebas de control de dopaje.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.



LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com) [farmacovigilancia.gt@gmail.com](mailto:farmacovigilancia.gt@gmail.com) [farmacovigilancia@donovanwerke.com](mailto:farmacovigilancia@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)