

# donosartán®

CANDESARTÁN CILEXETILO

## antihipertensivo

- donosartán® 16 mg tabletas
- donosartán® 32 mg tabletas

### CONOCIENDO donosartán®

**donosartán® 16 mg y donosartán® 32 mg tabletas** son medicamentos que contienen como principio activo el Candesartán cilexetilo, un antagonista oral de los receptores de Angiotensina II, utilizado para disminuir la presión arterial elevada en adultos. También, se recomienda en pacientes que no toleran los medicamentos inhibidores de la ECA. **donosartán®** tiene la propiedad de relajar y dilatar los vasos sanguíneos, produciendo la disminución de la presión arterial y mejorando además el trabajo cardíaco.

### QUÉ CONTIENE donosartán®

Cada tableta de **donosartán® 16 mg** contiene:  
Candesartán cilexetilo 16 mg  
Excipientes c.s.

Cada tableta de **donosartán® 32 mg** contiene:  
Candesartán cilexetilo 32 mg  
Excipientes c.s.

### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donosartán®

**donosartán®** está indicado en el tratamiento de:

- Personas con trastornos de presión arterial elevada (Hipertensión).
- Tratamiento de pacientes adultos con insuficiencia cardíaca y reducción de la función sistólica ventricular izquierda.
- Tratamiento de la hipertensión arterial cuando el paciente no tolera los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).

### CÓMO SE PRESENTA donosartán®

**donosartán® 16 mg tabletas** se presenta en caja con 15 y 45 tabletas contenidas dentro de burbujas individuales de blíster de foil de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

**donosartán® 32 mg tabletas** se presenta en caja con 15 y 45 tabletas contenidas dentro de burbujas individuales de blíster de foil de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico.

La dosis inicial que se recomienda en adultos es de 8 mg al día.

Si la presión arterial no se controla con esta dosis, puede incrementarse a 16 mg al día o hasta 32 mg al día como dosis máxima, dependiendo de la respuesta. Generalmente el efecto antihipertensivo efectivo se logra a las 4 semanas de tratamiento.

En personas con problemas en la función renal, pacientes en hemodiálisis y personas con alteraciones de la función hepática se recomienda iniciar con una dosis de 4 mg al día. La dosis debe ajustarse de acuerdo a la respuesta del paciente.

### ANTES DE USAR donosartán® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: no administrar en pacientes alérgicos a Candesartán cilexetilo o a cualquier otro medicamento o comida.
- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que Candesartán cilexetilo puede producir hipopotasemia, por lo que se recomienda monitorear periódicamente los niveles de potasio, así como la función renal, especialmente en ancianos a partir de los 75 años.
- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y monitorear periódicamente los niveles de potasio y creatinina sérica.

### CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en pacientes con nefropatía diabética.
- No utilizar en mujeres embarazadas o si planean quedar embarazadas, debe interrumpir el tratamiento con Candesartán cilexetilo e informar a su médico para que este le dé otro tratamiento.

### INTERACCIONES

- El uso concomitante de Candesartán cilexetilo con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos (como la heparina), pueden incrementar los niveles de potasio.
- El uso de Candesartán cilexetilo junto con litio, ha demostrado aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y su toxicidad.

## EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, los más comunes son: dolor de cabeza, mareo, hipotensión, hiperkalemia, disminución de glóbulos rojos, cansancio, erupción cutánea y dolor de espalda.

Suspenda su uso y consulte a su médico si se presentan algunos de los efectos adversos.

## COMUNICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en los descritos en esta información. También, puede comunicarlos directamente a través del Programa de Farmacovigilancia de Medicamentos. Gracias a la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Datos de contactos:

**farmacovigilancia.gt@gmail.com**

**farmacovigilancia@donovanwerke.com**

## USO ADECUADO DE donosartán®

- No mezclar con alcohol, porque puede experimentar desmayos o mareos.
- No combinar con AINEs, particularmente Ácido acetilsalicílico.
- Su médico le indicará la duración de su tratamiento. No suspenda el tratamiento si el médico no lo indica.
- Si usted olvida una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- Solo se debe usar en adultos.
- Si está tomando **donosartán®** podría dar positivo en pruebas de control de dopaje.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com). Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

