

dozozyt®

AZITROMICINA

antibiótico

- Tabletas recubiertas
- Polvo para suspensión oral

CONCIENDO dozozyt®

dozozyt® contiene como principio activo Azitromicina, un antibiótico macrólido del subgrupo de los azalídos. La actividad antibacteriana de **dozozyt®** abarca a bacterias grampositivas y gramnegativas como las siguientes:

Bacterias grampositivas aeróbicas:

Estafilococo dorado
Streptococo beta-hemolítico del grupo A
Streptococcus pneumoniae
Streptococo alfa-hemolítico (grupo viridans)
Corynebacterium diptheriae

Bacterias gramnegativas aeróbicas:

Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Branhamella catarrhalis
Acinetobacter
Yersinia
Vibrio cholerae y *parahaemolyticus*
Pleisiomanas shigelloides

Bacterias anaeróbicas:

Bacteroides fragilis
Bacteroides especies
Peptococcus especies
Peptostreptococcus especies
Fusobacterium necrophorum
Propionibacterium acnes

Microorganismos causantes de enfermedades venéreas:

Chlamydia trachomatis
Treponema pallidum
Neisseria gonorrhoeae
Haemophilus ducreyi

Otros microorganismos:

Borrelia burgdorferi
Chlamydia pneumoniae
Toxoplasma gondii
Mycobacterium avium
Campylobacter especies
Listeria monocytogenes

dozozyt® inhibe la síntesis proteica de las bacterias, interviniendo con la translocación de los péptidos en la porción 50s del ribosoma, sin afectar al ADN.

QUÉ CONTIENE dozozyt®

dozozyt® tabletas recubiertas
Cada tableta recubierta contiene:
Azitromicina 500 mg
Excipientes c.s.

dozozyt® polvo para suspensión oral

Cada 5 mL de suspensión preparada contienen:
Azitromicina 200 mg
Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO dozozyt®

dozozyt® está indicado para el tratamiento de las infecciones causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas, sensibles a la Azitromicina como: infecciones de las vías respiratorias altas (incluyendo sinusitis, faringitis, amigdalitis, tonsilitis), vías respiratorias bajas (incluyendo bronquitis y neumonía), otitis media, infecciones estomatológicas, infecciones de la piel y tejidos blandos y en la uretritis.

CÓMO SE PRESENTA dozozyt®

dozozyt® tabletas recubiertas: caja conteniendo 5 tabletas recubiertas de 500 mg de Azitromicina y el presente inserto.

dozozyt® polvo para suspensión oral: caja con frasco conteniendo polvo para preparar 15 mL de suspensión oral, conteniendo 200 mg de Azitromicina por cada 5 mL. Incluye frasco con agua purificada para preparar la suspensión, cucharita, jeringa dosificadora, instructivo y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

dozozyt® se debe administrar al menos una hora antes o dos horas después de las comidas.

Adultos

1 tableta de **dozozyt®** en dosis diaria durante 3 a 5 días.

En infecciones de transmisión sexual la dosis es de un gramo (2 tabletas recubiertas) en dosis única.

Niños

PESO Kg	DOSIFICACIÓN	TIEMPO
< 15	10 mg / kg una vez al día	3 a 5 días
15-25	200 mg una vez al día (5 mL)	3 a 5 días
26-35	300 mg una vez al día (7.5 mL)	3 a 5 días
36-45	400 mg una vez al día (10 mL)	3 a 5 días
> 45	Dosis para adulto	3 a 5 días

ANTES DE USAR dozozyt® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- En pacientes con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática se debe administrar con precaución.
- La administración durante el embarazo y lactancia queda exclusivamente a criterio del médico.
- No administrar en pacientes con antecedentes de alergia a la Azitromicina o a los antibióticos macrólidos; no se administrará en pacientes con insuficiencia hepática grave, ni en pacientes que estén tomando ergotamina.
- **dozozyt®** generalmente es bien tolerado, algunas veces pueden aparecer reacciones colaterales de tipo gastrointestinal.

USO ADECUADO DE dozozyt®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **dozozyt®** durante todo el tiempo que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si está muy cerca la próxima dosis, omita la dosis olvidada, y continúe con su horario de tratamiento normal.
- No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- **Polvo antes de preparar la suspensión y tabletas recubiertas:** protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
- **Suspensión preparada:** después de preparada la suspensión debe mantenerse en refrigeración a una temperatura de 5 °C ± 2 °C. Después de 5 días desechar cualquier sobrante.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

