

enterovid®

NIFUROXAZIDA

antidiarreico
antiséptico intestinal

- Tabletas recubiertas
- Suspensión oral

CONOCIENDO enterovid®

enterovid® contiene como principio activo Nifuroxazida, que es un medicamento antiséptico intestinal, es decir que destruye en el intestino las bacterias que causan la diarrea y evita que continúen desarrollándose. De esta manera es un efectivo antidiarreico que **no solo elimina los molestos síntomas de la diarrea, sino que actúa contrarrestando la infección que la ocasiona**. Por no ser un antibiótico, no destruye la flora bacteriana normal que es útil en la digestión y no produce resistencia bacteriana. Debido a que no se absorbe (su efecto es directo y estrictamente local sobre las bacterias presentes en el intestino) prácticamente **no presenta efectos secundarios, siendo seguro su uso incluso durante el embarazo, la lactancia y en niños**. La suspensión **presenta un agradable sabor a banano** lo que facilita su administración en niños.

QUÉ CONTIENE enterovid®

enterovid® tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Nifuroxazida 400 mg
Excipientes c.s.

enterovid® suspensión oral

Cada 5 mL (1 cucharadita) contienen:
Nifuroxazida 220 mg
Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO enterovid®

enterovid® está indicado en el tratamiento de **diarreas agudas y subagudas de origen bacteriano**. (*E. coli*, *salmonella*, *shigella*, *S. faecalis*, *S. dysenteriae*).

CÓMO SE PRESENTA enterovid®

enterovid® se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:



enterovid® tabletas recubiertas se presentan dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, contenidas dentro de un estuche de cartón reciclable en cantidad de 4 y 12 tabletas recubiertas con el presente inserto.

enterovid® suspensión oral se presenta en cantidad de 100 mL en un frasco de color ámbar que la protege de la luz ultravioleta, contenido dentro de un estuche de cartón reciclable. Se incluye una cucharita dosificadora para su comodidad y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La administración puede variar en los diferentes pacientes. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Producto	Dosis Usual	
enterovid® suspensión oral	Niños menores de 6 meses 1 cucharadita de 5 mL de suspensión dos veces al día por 4 días.	
	Niños de 6 meses a 6 años 1 cucharadita de 5 mL de suspensión tres veces al día por 4 días.	
	Adultos y niños mayores de 6 años 1 cucharadita de 5 mL de suspensión cada 6 horas ó 2 cucharaditas cada 12 horas.	
enterovid® tabletas recubiertas	Adultos y niños mayores de 6 años 1 tableta recubierta de 400 mg cada 12 horas por 5 días.	

ANTES DE USAR enterovid® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a la Nifuroxazida o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece alergia a cualquier otro medicamento o comida.

PRECAUCIONES

Contiene fenilalanina. Precaución en pacientes fenilcetonúricos.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Por ser un medicamento de acción local, puede administrarse en el embarazo y en la lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS

Debido a que la Nifuroxazida no se absorbe, prácticamente no presenta efectos adversos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.
DIVISIÓN DE LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al PBX: (502) 2412-6200
o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

COD. 53330

0120821

