

fank[®]

FAMOTIDINA

antagonista de los receptores H₂

- **Tabletas recubiertas**
- **Polvo para suspensión oral**

CONOCIENDO fank[®]

fank[®] pertenece a un grupo de medicamentos llamados antagonistas de los receptores H₂, los cuales actúan inhibiendo la secreción de ácido gástrico. Es por ello que fank[®] es utilizado para tratar úlceras (heridas en el recubrimiento interno del estómago o del intestino delgado), enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE), el síndrome de Zollinger-Ellison (tumores en el páncreas o intestino delgado que provocan un aumento de la producción de ácido del estómago) o gastritis (inflamación del revestimiento gástrico) de cualquier origen.

QUÉ CONTIENE fank[®]

fank[®] 20 mg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:

Famotidina 20 mg

Excipientes c.s.

fank[®] 40 mg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:

Famotidina 40 mg

Excipientes c.s.

fank[®] 40 mg/5 mL polvo para suspensión oral

Cada 5 mL de suspensión contienen:

Famotidina 40 mg

Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO fank[®]

fank[®] está indicado en el tratamiento de úlceras por estrés, duodenales y gástricas, gastritis de cualquier origen, acidez estomacal asociada con indigestión ácida o por el síndrome de Zollinger-Ellison y para la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE).

COMÓ SE PRESENTA fank[®]

fank[®] 20 mg y 40 mg tabletas recubiertas se presentan en caja con 10 tabletas recubiertas contenidas en burbujas individuales de blíster de aluminio/aluminio, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

También, se presenta en dispensador con 120 tabletas recubiertas (24 sobres de 5 tabletas recubiertas), cada tableta recubierta en burbujas individuales de blíster de aluminio/aluminio, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta.

fank[®] 40 mg/5 mL polvo para suspensión oral se presenta en caja conteniendo un frasco con polvo para suspensión oral y un frasco con agua purificada en cantidad suficiente para su preparación. Incluye cucharita dosificadora para su fácil administración, además de un instructivo de uso y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

- **Úlcera duodenal:** 1 tableta recubierta de 40 mg por la noche o bien 1 tableta recubierta de 20 mg cada 12 horas. Durante 4 a 8 semanas.
- **Úlcera gástrica:** 1 tableta recubierta de 20 mg por las noches.
- **Gastritis por estrés:** 1 tableta recubierta de 20 mg por las noches.
- **Síndrome de Zollinger-Ellison:** 1 tableta recubierta de 20 mg cada 6 horas.
- **Enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE):** 1 tableta recubierta de 20 mg cada 12 horas.

Niños y adolescentes

Enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE)

EDAD	DOSIS	FRECUENCIA
< 3 meses		1 vez al día
3 meses a 12 meses	0.5 mg/kg de peso	2 veces al día
1 año a 16 años	0.5 mg/kg de peso. La dosis máxima diaria es de 40 mg.	1 vez al día o cada 12 horas. Sin pasar de la dosis máxima.

Úlcera péptica

EDAD	DOSIS	FRECUENCIA
1 año a 16 años	0,5 mg/kg de peso. La dosis máxima diaria es de 40 mg.	1 vez al día o cada 12 horas. Sin pasar de la dosis máxima.

ANTES DE USAR **fank**[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: Infórmele a su médico si usted es alérgico a la Famotidina o a cualquier otro medicamento o comida.
- No tome **fank**[®] si está embarazada, si cree que pudiera estarlo o si tiene intención de quedar embarazada.
- Si está en periodo de lactancia debe suspender el tratamiento con **fank**[®] o interrumpir la lactancia.
- Si está en tratamiento con antifúngicos por vía oral, debe tomar **fank**[®] 2 horas después de haber ingerido su medicamento antifúngico.

EFFECTOS ADVERSOS

Algunos de los efectos adversos que se presentan más frecuentemente al utilizar **fank**[®] son: dolor de cabeza, mareos, exceso de gases intestinales, estreñimiento o diarrea. En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE **fank**[®]

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- Tomar las tabletas recubiertas enteras, no fraccionar ni pulverizar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Tabletas recubiertas y polvo antes de preparar la suspensión: protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Suspensión preparada: después de preparar la suspensión debe mantenerse en un lugar fresco y seco. Después de 5 días desechar el sobrante.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com.
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

