

hepakral forte®

COMPLEJO DE SILIBINA CON FOSFATIDILCOLINA

protector y regenerador hepático de última generación

- Tabletas recubiertas
- Polvo para suspensión oral

CONOCIENDO hepakral forte®

hepakral forte® es el protector y regenerador hepático de última generación. El producto contiene Silibina, la cual es el componente de mayor actividad terapéutica de la silimarina. Actúa protegiendo el hígado, tanto por las propiedades antioxidantes, como por su capacidad desintoxicante. Además ha demostrado mediante evidencia clínica ser regenerador hepático.

Para lograr una mejor absorción, en nuestro producto **hepakral forte®** la Silibina está unida a un complejo de Fosfatidilcolina en un sistema biotecnológico avanzado conocido como fitosoma. Este complejo se comporta como un vehículo natural de la Silibina que resulta ser la combinación ideal que permite incrementar hasta 10 veces su absorción y biodisponibilidad, lo que garantiza su efecto terapéutico.

QUÉ CONTIENE hepakral forte®

hepakral forte® tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Complejo de Silibina con Fosfatidilcolina 240 mg
equivalente a 79.2 mg de Silibina
Excipientes c.s.

hepakral forte® polvo para suspensión oral

Cada 5 mL de suspensión preparada contienen:
Complejo de Silibina con Fosfatidilcolina 240 mg
equivalente a 79.2 mg de Silibina
Vehículo c.s.

EN QUÉ CASO ESTÁ INDICADO hepakral forte®

hepakral forte® está indicado como regenerador y protector hepático en los siguientes casos:

- Hepatitis.
- Cirrosis.
- Hígado graso.
- Otras patologías en las que pueda presentarse daño hepático.

También está indicado como preventivo y protector en:

- Pacientes bajo tratamiento con diversos medicamentos.
- Personas con dieta desbalanceada, con exceso de grasa o alcohol.
- Pacientes con tratamiento quimioterápico.
- Personas que por su trabajo estén expuestas a sustancias químicas varias o a radiaciones de cualquier tipo.

CÓMO SE PRESENTA hepakral forte®

hepakral forte® tabletas recubiertas se presenta en caja con 40 tabletas recubiertas contenidas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

hepakral forte® polvo para suspensión se presenta en caja con envase conteniendo el polvo y un envase con agua purificada en cantidad apropiada para preparar 120 mL de suspensión.


Incluye un instructivo de uso, un vasito dosificador y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.



La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Siga las instrucciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

hepakral forte® tabletas recubiertas

Indicaciones	Dosis	
Regenerador y protector hepático	1 tableta recubierta cada 8 horas.	

En casos severos: tomar 1 tableta recubierta cada 6 horas. Como dosis de mantenimiento: tomar 1 tableta recubierta cada 12 horas

hepakral forte® polvo para suspensión

Indicaciones	Dosis	
Regenerador y protector hepático	5 o 10 mL de suspensión preparada 1 vez al día	
Casos severos	15 o 20 mL de suspensión preparada 1 vez al día o según criterio médico	

ANTES DE USAR hepakral forte® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Si ha presentado algún tipo de alergia a medicamentos, consulte a su médico.
- No se recomienda utilizar **hepakral forte®** durante el embarazo ni tampoco durante la lactancia, salvo que, a criterio médico, el beneficio supere el riesgo.

USO ADECUADO DE hepakral forte®

- No se administre más dosis ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Administre el medicamento por el tiempo que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- **Polvo antes de preparar la suspensión y tabletas recubiertas:** protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.
- **Suspensión preparada:** almacenarla a temperatura ambiente y utilizarla en un periodo no mayor de 30 días. Al cabo de ese tiempo desechar el sobrante.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.
DIVISIÓN DE LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

