

iprak[®] 750 SP

SIN PRESERVANTES

BROMURO DE IPRATROPIUM

para el tratamiento del broncoespasmo agudo

Solución para respirador

CONOCIENDO iprak[®] 750 SP

iprak[®] 750 SP solución para respirador por su acción directa y local sobre los receptores muscarínicos de la mucosa bronquial, ejerce una acción broncodilatadora, aliviando la dificultad respiratoria ocasionada por el broncoespasmo que se presenta en el asma bronquial, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Al mismo tiempo, **iprak[®] 750 SP solución para respirador** controla la secreción del moco bronquial, facilitando la respiración.

La fórmula de **iprak[®] 750 SP solución para respirador** es única ya que está libre de preservantes, lo que reduce los efectos colaterales producidos por estos. Por su alta tecnología con el **envase gotero de anticontaminación** (sin preservantes), garantiza la esterilidad del medicamento.

QUÉ CONTIENE iprak[®] 750 SP

Cada 1 mL de **iprak[®] 750 SP solución para respirador** contiene Bromuro de ipratropium monohidratado equivalente a 750 mcg de Bromuro de ipratropium (una gota equivalente a 25.00 mcg) Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO iprak[®] 750 SP

iprak[®] 750 SP solución para respirador está indicado para el alivio de la obstrucción bronquial (broncoespasmo) que se presenta en los ataques agudos de:

- Asma bronquial
- Bronquitis crónica
- Enfisema pulmonar

CÓMO SE PRESENTA iprak[®] 750 SP

iprak[®] 750 SP solución para respirador de 20 mL se presenta en caja con dos envases gotero dosificadores flexibles tipo OSD ambos con membrana multicapa y cierre especial que evita la contaminación, conteniendo cada uno 10 mL de producto, un envase con 30 mL de solución salina normal, un gotero dosificador y el presente inserto.

iprak[®] 750 SP solución para respirador de 10 mL se presenta en caja con un envase gotero dosificador flexible tipo OSD con membrana multicapa y cierre especial que evita la contaminación, conteniendo 10 mL de producto, un envase con 30 mL de solución salina normal, un gotero dosificador y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración por inhalación.

La dosis puede ser diferente para cada tipo de paciente. Siga las instrucciones que su médico le indique. Se debe administrar en combinación con solución salina normal u otro broncodilatador, mediante el uso de un nebulizador (ver instructivo adjunto). A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 a 20 gotas por cada nebulización 1 a 3 veces al día (250 a 500 mcg por dosis).

Niños menores de 12 años: 5 a 10 gotas por cada nebulización 1 a 3 veces al día (125 a 250 mcg por dosis).

ANTES DE USAR iprak[®] 750 SP LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Evitar que la solución entre en contacto con los ojos debido a los efectos secundarios que se pueden presentar (dilatación de pupilas, visión borrosa, enrojecimiento ocular).
- Administrar con precaución en especial en pacientes con posible obstrucción del cuello de la vejiga.
- Infórmele a su médico si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o alimento.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia a la atropina, belladona, hiosciamina o algún otro medicamento administrado por inhalación
- Glaucoma (presión alta en el ojo)
- Cardiopatía (enfermedad del corazón)
- Hipertrofia prostática (agrandamiento de la próstata)
- Retención de orina
- Obstrucción intestinal
- Embarazo y lactancia

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos, **iprak[®] 750 SP solución para respirador** pueden presentarse algunos efectos adversos tales como Cefalea (dolor de cabeza), Náusea, Sequedad en la boca, Palpitaciones y Visión borrosa.

En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE iprak[®] 750 SP

- No administre más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómelas tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.


Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.


FORMA DE ADMINISTRACIÓN




En el interior de la caja de **iprak® 750 SP** solución para respirador, encontrará en la presentación de 20 mL: 2 envases de producto y en la presentación de 10 mL: un envase de producto, teniendo ambas un envase de solución salina normal. El producto y la solución salina normal se mezclan en el nebulizador en las cantidades que le indique su médico.




Ponga el número de gotas de **iprak® 750 SP** solución para respirador que le indique su médico en el recipiente, para esto posicionar el envase a 45° (inclinado). Aplicar la presión necesaria para que inicie el goteo.




Tape el recipiente del nebulizador.



Destape el recipiente del nebulizador.



Ponga con ayuda del gotero dosificador el número de mililitros de solución salina normal que le indique su médico en el recipiente.



Conéctelo al compresor y nebulice de acuerdo a las instrucciones de su médico, no debe aplicar más producto hasta terminar totalmente la mezcla preparada.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com. Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

