

---

---

---

---

---

---

# aerovan<sup>®</sup> SP

SIN PRESERVANTES

SALBUTAMOL

*tratamiento del broncoespasmo agudo*

## KIT DE NEBULIZACIÓN

Solución para respirador

### CONOCIENDO SU KIT DE NEBULIZACIÓN DE aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP

El kit de nebulización **aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP** solución para respirador, tiene como principios activos Salbutamol y Bromuro de ipratropium, los cuales ejercen una acción broncodilatadora, aliviando la dificultad respiratoria ocasionada por el broncoespasmo que se presenta en el asma bronquial y otras enfermedades pulmonares. El uso combinado de **aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP** potencializa el efecto broncodilatador, proporcionando un efecto beneficioso que facilita la respiración del paciente.

La fórmula de **aerovan<sup>®</sup> SP** e **iprak<sup>®</sup> 750 SP** solución para respirador es única ya que está libre de preservantes lo que reduce los efectos colaterales producidos por éstos. Por su alta tecnología con el **gotero de anticontaminación** (sin preservantes), garantiza la esterilidad del medicamento.

### QUÉ CONTIENE SU KIT DE NEBULIZACIÓN DE aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP

Cada 1 mL de **aerovan<sup>®</sup> SP** contiene Salbutamol sulfato equivalente a 5 mg de Salbutamol base (cada gota equivale a 0.167 mg) y cada 1 mL de **iprak<sup>®</sup> 750 SP** contiene Bromuro de ipratropium monohidratado equivalente a 750 mcg de Bromuro de ipratropium (una gota equivalente a 25.00 mcg).  
1 mL de **aerovan<sup>®</sup> SP** solución = 30 gotas.  
1 mL de **iprak<sup>®</sup> 750 SP** solución = 30 gotas.

### EN QUÉ CASO ESTÁ INDICADO SU KIT DE NEBULIZACIÓN DE aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP

Está indicado para el tratamiento del broncoespasmo agudo que se presenta en el asma bronquial y otras enfermedades pulmonares tales como bronquitis crónica y enfisema pulmonar.

### CÓMO SE PRESENTA SU KIT DE NEBULIZACIÓN DE aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP

**aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP** se presenta por separado en envases dosificadores flexibles tipo OSD con cuentagotas que contienen 10 mL de producto cada uno, 2 envases con 30 mL de solución salina normal cada uno, 2 goteros dosificadores y el presente inserto.

# iprak<sup>®</sup> 750 SP

SIN PRESERVANTES

BROMURO DE IPRATROPIUM

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración inhalada.

La dosis puede variar para los distintos pacientes. Siga las instrucciones que su médico le indique. El kit de nebulización **aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP** debe administrarse mediante el uso de un nebulizador o respirador y puede ser utilizado diluido con solución salina normal o puro, según criterio médico.

Forma de administrar con nebulizador (ver diagramas adjuntos): colocar el número de gotas que indique su médico de **aerovan<sup>®</sup> SP** e **iprak<sup>®</sup> 750 SP** diluidos con 1.5 mL de solución salina normal para obtener un volumen de 2 a 2.5 mL. Inhalar con el nebulizador hasta terminar la cantidad de medicamento. Elimine todo el sobrante de la solución para nebulizar que quede en la cámara del nebulizador después del tratamiento.

### ANTES DE USAR SU KIT DE NEBULIZACIÓN aerovan<sup>®</sup> SP iprak<sup>®</sup> 750 SP LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Evitar que la solución entre en contacto con los ojos debido a los efectos secundarios que se pueden presentar (dilatación de pupilas, visión borrosa, enrojecimiento ocular).
- Administrar con precaución en especial en pacientes con posible obstrucción del cuello de la vejiga.
- Utilizar con precaución en pacientes con tirotoxicosis, aquellos que se encuentran con tratamiento a grandes dosis de drogas simpaticomiméticas y en diabéticos (por producir aumento sobre los niveles de azúcar en la sangre).
- No usar en conjunto con propranolol y otras sustancias betabloqueadoras no selectivas.
- No administrar por vía oral, ocular, ni inyectable.

### CONTRAINDICACIONES

- No debe administrarse en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- En glaucoma (presión alta en el ojo), cardiopatía (enfermedad del corazón), hipertrofia prostática (agrandamiento de la próstata), retención de orina y obstrucción intestinal.
- Embarazo y lactancia.

## EFFECTOS ADVERSOS


Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, los cuales aparecen con poca frecuencia, tales como: dolor de cabeza, náusea, sequedad en la boca, palpitaciones, visión borrosa y temblor de extremidades.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO


Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.


Administración, dosis y venta según prescripción médica.




**1**  
Destape el recipiente.




**2**  
Ponga el número de gotas de **aerovan® SP** e **iprak® 750 SP** que le indique su médico en el recipiente.



**3**  
Ponga el número de mililitros de solución salina normal que le indique su médico en el recipiente.



**4**  
Tape el recipiente.



**5**  
Conéctelo al compresor y nebulice.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
**A.G.S.A.**



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)