

kolpas®

PROPINOXATO CLORHIDRATO

antiespasmódico

Solución oral gotas

CONOCIENDO kolpas® solución oral gotas

kolpas® solución oral gotas es un medicamento antiespasmódico que contiene como principio activo Propinoxato clorhidrato, el cual actúa aliviando los cólicos que se presentan en los niños que están en la etapa de lactancia, así como en los que oscilan entre las edades de 2 a 12 años. **kolpas® solución oral gotas** tiene un sabor agradable que facilita la toma en niños.

QUÉ CONTIENE kolpas® solución oral gotas

Cada 1 mL de solución oral gotas contiene:

Propinoxato clorhidrato 5 mg
Vehículo c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kolpas® solución oral gotas
kolpas® solución oral gotas está indicado para el tratamiento de cólicos gastrointestinales que se presentan en niños desde la etapa de lactancia hasta los 12 años de edad.

CÓMO SE PRESENTA kolpas® solución oral gotas

kolpas® solución oral gotas se presenta en caja que incluye un frasco gotero con 20 mL de solución (1 mL equivale a 20 gotas), y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosificación y duración del tratamiento depende del problema que el niño presente y de las indicaciones de su médico. La siguiente información corresponde a las dosis usuales de Propinoxato clorhidrato. Si su médico indica otra dosis, no la cambie a menos que él lo autorice. A continuación se presentan dos tablas. Ubique al niño en la que le corresponde según su edad y luego siga las instrucciones respectivas.

Lactantes y niños de hasta 2 años

A continuación se presenta una tabla de pesos con su respectivo número de gotas que se deben administrar tres veces al día. Busque en la columna de Peso Libras, el peso del paciente y determine en la columna siguiente cuantas gotas le corresponde. Por ejemplo, si el niño pesa 15 libras, administre 2 gotas en la mañana, 2 gotas al medio día y 2 gotas en la noche.

Peso Libras	Gotas 3 veces al día	Peso Libras	Gotas 3 veces al día	Peso Libras	Gotas 3 veces al día
6	1	15	2	24	4
7	1	16	2	25	4
8	1	17	3	26	4
9	1	18	3	27	4
10	2	19	3	28	4
11	2	20	3	29	4
12	2	21	3	30	5
13	2	22	3		
14	2	23	3		

Niños de 2 a 12 años

A continuación se presenta una tabla de edad con su respectivo número de gotas que se deben administrar tres veces al día. Busque en la columna Edad años, la edad del paciente y determine en la columna siguiente el número de gotas que le corresponden. Administre ese número de gotas tres veces al día. Por ejemplo, si el niño tiene 4 años, administre 6 gotas en la mañana, 6 gotas al medio día y 6 gotas en la noche.


Edad años	Gotas 3 veces al día	Edad años	Gotas 3 veces al día	Edad años	Gotas 3 veces al día
2	4	6	8	10	12
3	5	7	9	11	13
4	6	8	10	12	14
5	7	9	11		

Adultos y niños mayores de 12 años

Administrar 20 gotas hasta 5 veces al día.

Nota: Estas dosis pueden ser incrementadas sin problema según criterio médico.

Antes de administrar las gotas, debe agitar el frasco, luego colocarlo en forma vertical con el gotero hacia abajo para verter las gotas.



ANTES DE USAR kolpas® solución oral gotas LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

Alergia: No administrar en pacientes alérgicos al Propinoxato clorhidrato o a cualquier otro medicamento o comida.

USO ADECUADO DE kolpas® solución oral gotas

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

