

kralcolik®

TRIMEBUTINA MALEATO

antiespasmódico

- Tabletas
- Tabletas recubiertas de liberación prolongada

CONOCIENDO kralcolik®

kralcolik® es un medicamento que contiene como principio activo Trimebutina maleato. Perteneciente al grupo de los agentes relajantes directos del músculo liso, por lo que se clasifica como un antiespasmódico que previene o interrumpe los espasmos del músculo liso intestinal. Su mecanismo de acción es actuar sobre las miofibrillas del músculo liso del aparato digestivo, reduciendo el tono y el peristaltismo y aliviando los espasmos intestinales sin afectar de forma sustancial la motilidad gastrointestinal.

QUÉ CONTIENE kralcolik®

Cada tableta de kralcolik® 200 mg contiene:
Trimebutina maleato 200 mg
Excipientes c.s.

Cada tableta recubierta de liberación prolongada de kralcolik® 300 mg XR contiene:
Trimebutina maleato 300 mg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kralcolik®

kralcolik® está indicado como normalizador del tránsito gastrointestinal y en el tratamiento del síndrome de colon irritable (SCI) o colitis, colopatías funcionales y colon espástico, así como para aliviar los síntomas característicos de estos padecimientos, tales como dolor abdominal tipo cólico, constipación y/o diarrea, distensión abdominal, meteorismo y flatulencia.

CÓMO SE PRESENTA kralcolik®

kralcolik® 200 mg tabletas se presenta en caja conteniendo 30 tabletas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

kralcolik® 300 mg XR tabletas recubiertas de liberación prolongada se presenta en caja conteniendo 20 y 30 tabletas de liberación prolongadas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presenta la dosis promedio usual:

Adultos

kralcolik® 200 mg tabletas: 1 a 3 tabletas al día.

kralcolik® 300 mg XR tabletas recubiertas de liberación prolongada: 1 tableta al día, preferiblemente con el almuerzo, de ser necesario, incrementar la dosis a 1 tableta 2 veces al día en intervalos regulares.

* No exceder de 600 mg al día.

ANTES DE USAR kralcolik® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: Infórmele a su médico si usted es alérgico a Trimebutina o alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- No se recomienda el uso de Trimebutina durante el embarazo especialmente durante el primer trimestre.

CONTRAINDICADO

- En glaucoma
- En hipertrofia prostática

INTERACCIONES

- La administración concurrente con antiácidos puede interferir con el efecto terapéutico de Trimebutina, en estos casos se aconseja administrar por lo menos 3 horas luego de la ingesta de Trimebutina.
- En pacientes tratados con antihipertensivos se recomienda precaución ya que la Trimebutina puede inducir en raras ocasiones hipotensión.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, entre ellos los más comunes son: sequedad de boca, náusea, diarrea, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, fatiga. Si cualquiera de estos u otros síntomas no esperados se presentan consulte a su médico.

USO ADECUADO DE kralcolik®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

