

# kralfato®

SUCRALFATO

**protector gástrico  
antiulceroso**

Suspensión oral

## CONOCIENDO kralfato®

**kralfato® suspensión oral** es un medicamento que contiene como principio activo Sucralfato, que es una sustancia utilizada para el tratamiento y prevención de la úlcera duodenal. Actúa formando una barrera o recubrimiento sobre la úlcera e inhibiendo la actividad de la pepsina, esto la protege del ataque de los ácidos del estómago, pepsina y bilis, permitiéndole sanar. También forma una barrera adhesiva y viscosa en la superficie de la mucosa del estómago y del duodeno que no tiene daño, previniendo así que se produzca una úlcera. Información reciente sugiere que el Sucralfato también incrementa la producción del mucus gástrico.

## QUÉ CONTIENE kralfato®

Cada 5 mL de **kralfato® suspensión oral** contienen:

Sucralfato 1 g  
Vehículo c.s.

## EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO kralfato®

**kralfato® suspensión oral** está indicado para:

- Tratamiento y prevención de úlcera duodenal.
- Tratamiento de úlcera gástrica.
- Alivio de síntomas gastrointestinales asociados con el uso de antiinflamatorios no esteroideos.
- Tratamiento y prevención de daño a la mucosa gástrica y úlcera inducida por el estrés, especialmente a pacientes en cuidado intensivo.
- Tratamiento de reflujo gastroesofágico.

## CÓMO SE PRESENTA kralfato®

**kralfato® suspensión oral** se presenta en envase pet conteniendo 240 mL y un vasito dosificador para facilitar su administración.

**kralfato® suspensión oral** también se presenta en una caja de 30 sobres conteniendo cada uno 5 mL de la suspensión. Todas las presentaciones incluyen el presente inserto.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede variar para los diferentes pacientes. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

Tomar 5 mL 4 veces al día administrados media hora antes de cada comida y antes de acostarse o 10 mL 2 veces al día con el estómago vacío, una al levantarse y otra antes de acostarse.

## ANTES DE USAR kralfato® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** no administrar en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- **Embarazo y lactancia:** no se recomienda la administración durante el embarazo y lactancia debido a la falta de estudios suficientes.
- **Uso con otros medicamentos:** si usted está utilizando otros medicamentos infórmeselo a su médico antes de utilizar **kralfato® suspensión oral**, especialmente en caso de:
  - Antidiarreicos
  - Ácido acetil salicílico
  - Antiácidos
  - Antagonistas histamínicos H<sub>2</sub>
  - Quinolonas
  - Digoxina y teofilina
  - Fenitoína y tetraciclinas
  - Cimetidina
- **Otros problemas médicos:** infórmele a su médico si usted padece problemas de obstrucción del tracto gastrointestinal, o trastornos renales.

## EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, en algunas ocasiones se han presentado estreñimiento, sequedad de la boca, náusea, sensación de llenura o erupciones cutáneas. Si estos u otros síntomas no deseados se presentan, consulte a su médico.

## USO ADECUADO DE kralfato®

- Es preferible tomar **kralfato® suspensión oral** con el estómago vacío, de media a una hora antes o dos horas después de las comidas y antes de acostarse.
- Tome **kralfato® suspensión oral** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy próxima, omite la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

KRAL PHARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A.  
DIVISIÓN DE LABORATORIO Y DROGUERÍA  
DONOVAN WERKE A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

