

metilbdoce®

METILCOBALAMINA

anemia megaloblástica neuropatía periférica

- Solución inyectable
- Tabletas recubiertas

CONOCIENDO metilbdoce®

metilbdoce® es un medicamento que contiene como principio activo Metilcobalamina, una forma activa de la Vitamina B12, se compone por un complejo octaédrico de cobalto, al que se ha ligado un metilo (CH₃), es mejor absorbida y retenida dentro de los tejidos, en comparación con la cianocobalamina. Es ampliamente utilizada para tratar o prevenir patologías derivadas de la falta de vitamina B12 tales como la anemia megaloblástica causada por la disminución de la producción de glóbulos rojos sanos en la sangre. Metilcobalamina es necesaria para el funcionamiento normal del sistema nervioso, ya que tiene efectos analgésicos potenciales en patologías de origen nervioso mejorando la conducta nerviosa y promoviendo la regeneración de los nervios dañados e inhibiendo las descargas ectópicas espontáneas de las neuronas sensitivas primarias lesionadas. Por lo que es ampliamente utilizada para el tratamiento de la neuropatía periférica causada por daños en los nervios localizados fuera del cerebro y la médula espinal.

QUÉ CONTIENE metilbdoce®

metilbdoce® 500 mcg/1 mL solución inyectable

Cada ampolla de 1 mL contiene:
Metilcobalamina 500 mcg
Vehículo c.s.

metilbdoce® 500 mcg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Metilcobalamina 500 mcg
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO metilbdoce®

metilbdoce® está indicado para el tratamiento o prevención de anemia megaloblástica y neuropatía periférica.

CÓMO SE PRESENTA metilbdoce®

metilbdoce® 500 mcg/1 mL solución inyectable se presenta en caja con 1, 5 y 10 ampollas, incluyendo jeringas descartables, toallitas con alcohol, y el presente inserto.

metilbdoce® 500 mcg tabletas recubiertas se presenta en caja con 30 tabletas recubiertas, dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes, siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

metilbdoce® 500 mcg/1 mL solución inyectable

Vía de administración intramuscular o subcutánea profunda.

La dosis promedio recomendada es de una ampolla de 1 mL (500 mcg) 3 veces por semana.

metilbdoce® 500 mcg tabletas recubiertas

Vía de administración oral.

La dosis promedio recomendada es de 1 tableta recubierta cada 8 horas para la anemia megaloblástica y 1 tableta recubierta cada 24 horas para neuropatía periférica.

ANTES DE USAR metilbdoce® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: Infórmele a su médico si usted es alérgico a Metilcobalamina, al cobalto o alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- Si padece o ha padecido de alguna forma de daño al nervio óptico.
- Si tiene deficiencia de hierro, ácido fólico o si presenta niveles bajos de potasio en la sangre.
- Si está embarazada o lactando.
- Metilcobalamina presenta una respuesta terapéutica disminuida por el uso de cloranfenicol y otros depresores de la médula ósea.
- Medicamentos utilizados para reducir el ácido estomacal, o la metformina afectan la absorción a nivel intestinal de la Metilcobalamina.
- Si está tomando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos se pueden presentar efectos adversos, entre ellos los más frecuentes son:

- Náuseas
- Vómito
- Diarrea
- Pérdida del apetito
- Dolor de cabeza

Se sugiere suspender su uso y consultar a su médico si se presentan alguno de los efectos adversos mencionados o bien otros que no aparezcan en la lista.

USO ADECUADO DE metilbdoce®

- Administre **metilbdoce®** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida una dosis, adminístrela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.



LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com