



## INSTRUCCIONES DE USO

Lea esta información antes de utilizar **momemist® infantil suspensión para spray nasal** y siga estrictamente las siguientes instrucciones, para obtener la máxima eficacia.

1. Quite la tapa de protección.  
**Ver figura No. 1**



2. Antes de usar por primera vez **momemist® infantil suspensión para spray nasal**, el medicamento debe cargarse en el aplicador nasal, para ello agite el envase y accione la bomba dos veces.  
**Ver figura No. 2**



3. Límpiense las fosas nasales completamente.

4. Tápese una fosa nasal e introduzca la punta del frasco en la fosa nasal libre, manteniendo la cabeza inclinada hacia abajo. **Ver figura No. 3**

5. Para cada aplicación presione hacia abajo el spray.

6. Inspire suavemente la fosa nasal donde se esta aplicando el spray.



7. Aplique el aerosol en la otra fosa nasal de la misma manera.

8. Administre el número de aplicaciones prescritas.

# momemist® infantil

## MOMETASONA FUROATO

### tratamiento de rinitis

#### Suspensión para spray nasal

#### CONOCIENDO momemist® infantil

**momemist® infantil** es una suspensión acuosa nasal que contiene como principio activo Mometasona furoato, el cual es un glucocorticosteroide que tiene propiedades antiinflamatorias en los conductos nasales. Este medicamento se administra tópicamente vía nasal con la utilización de un atomizador especial, que suministra con cada aplicación de la suspensión una cantidad de 50 mcg de Mometasona furoato. Actúa de manera local a dosis que no son activas a nivel sistémico.

#### QUÉ CONTIENE momemist® infantil

Cada aplicación de **momemist® infantil** suministra aproximadamente 100 mg de suspensión acuosa que contiene 50 microgramos (mcg) de Mometasona furoato.

**momemist® infantil**: contiene 9 gramos de suspensión equivalente a 70 aplicaciones.

#### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO momemist® infantil

**momemist® infantil** está indicado para el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica estacional o perenne y las crónicas (congestión nasal, secreciones nasales, picazón y estornudos).

#### CÓMO SE PRESENTA momemist® infantil

**momemist® infantil** se presenta en caja conteniendo un envase spray con 9 gramos de suspensión y el presente inserto-instructivo.

El envase de **momemist® infantil** posee una válvula de última generación que incluye un sistema 100% libre de preservantes gracias a su punta selladora y a un filtro microbiológico con tamaño de poro 0.22 micrones, esto evita el ingreso de bacterias aéreas diminutas que pasen a través del filtro manteniendo la formulación estéril antes, durante y después de su uso. Es el único producto en el mercado, libre de preservantes por lo cual hay una prevención total de efectos colaterales provocados por su uso; con **momemist® infantil** no existirá el problema de daños en el sistema ciliar. Adicionalmente el orificio del actuador nasal con su punta selladora evita el ingreso de contaminantes aéreos, evita el contacto metálico con la formulación, siendo un sistema totalmente sellado.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVANWERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala  
al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración nasal.

La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Siga las instrucciones que su médico le indique.

A continuación la dosis promedio usual:

### Niños de 2 a 11 años:

La dosis que se recomienda es de 1 aplicación en cada fosa nasal una vez al día, para un total de 100 mcg. En el caso de niños muy pequeños es necesario que sean asistidos por un adulto.

### ANTES DE USAR momemist® infantil LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Infórmele a su médico si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- No se recomienda utilizar **momemist® infantil** si hay presencia de infección localizada sin tratamiento.
- En pacientes sometidos a cirugía nasal o trauma nasal, no es recomendable usar corticosteroides ya que inhiben la cicatrización.
- Es recomendable suspender el tratamiento si se presenta una infección micótica localizada en la nariz o en la faringe.
- Debe utilizarse **momemist® infantil** con precaución en pacientes con infección tuberculosa activa o latente del tracto respiratorio o en infecciones micóticas, bacterianas, virales sistémicas sin tratamiento o en Herpes simple ocular.
- Los recién nacidos de madres que hayan recibido corticosteroides durante el embarazo deberán ser observados cuidadosamente en cuanto a signos de insuficiencia suprarrenal.
- Debe notificarse al médico antes de su uso si se ha padecido infección ocular a causa de herpes, catarata o glaucoma.
- Es necesario evitar exponerse a la varicela o sarampión mientras esté utilizando **momemist® infantil**, si esto sucede consulte a su médico.
- Se recomienda vigilar regularmente la altura de los niños y adolescentes sometidos a un tratamiento prolongado con corticosteroides por vía nasal. Si se detecta un retraso en el crecimiento, deberá revisarse el tratamiento con objeto de, si es posible, reducir la dosis administrada a la mínima con la que se consiga un control efectivo de los síntomas. Debe además considerarse la revisión del paciente por parte de un pediatra.

### USO CON OTROS MEDICAMENTOS

Si usted está tomando otros medicamentos es recomendable que le informe a su médico. **momemist® infantil suspensión para spray nasal** puede ser administrado de manera simultánea con Loratadina sin que se haya observado un efecto aparente en la concentración plasmática de ésta o sus metabolitos. El tratamiento combinado ha sido muy bien tolerado.

## EFFECTOS NO DESEADOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos no deseados, entre ellos puede ocurrir: dolor de cabeza, dolor de garganta, sangrado de nariz, ardor, irritación o resequedad. Si estos efectos persisten o empeoran es necesario consultar al médico o bien de informarle de inmediato si se llegase a presentar dolor de nariz, silbido al respirar, cambios en la visión, sangrado reiterado de la nariz, dolor o dificultad al tragar.

### USO ADECUADO DE momemist® infantil

Si usted olvida administrar una dosis, hágalo tan pronto como sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario normal. No duplique la dosis.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

