

perivan®

MOSAPRIDA CITRATO

regulador de la motilidad gastrointestinal

Tabletas

CONOCIENDO perivan®

perivan® tabletas contiene como principio activo Mosaprida citrato, el cual estimula la motilidad gástrica y esofágica, disminuye el tiempo de vaciamiento gástrico y alivia la dispepsia funcional, gastroparesia y reflujo gastroesofágico.

QUÉ CONTIENE perivan®

perivan® tabletas

Cada tableta contiene:

Mosaprida citrato dihidrato equivalente

a Mosaprida citrato 5 mg

Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO perivan®

perivan® tabletas está indicado en el tratamiento de:

- Trastornos de la motilidad gastrointestinal
- Dispepsia no ulcerosa
- Reflujo gastroesofágico
- Gastroparesia
- Síntomas digestivos (ardor estomacal, náusea, vómito) que acompañan a la gastritis crónica.

CÓMO SE PRESENTA perivan®

perivan® tabletas se presenta en caja de 30 tabletas contenidas dentro de burbujas individuales de blíster que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las indicaciones que le dé su médico. A continuación se presenta la dosis promedio usual:

Adultos

Administrar 1 tableta de **perivan®** 3 veces al día antes de los alimentos.

ANTES DE USAR perivan® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Alergia: No administrar en pacientes alérgicos a los componentes de la fórmula. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- Embarazo y lactancia: no administrar durante el embarazo y lactancia.
- Administrar con precaución en pacientes con función hepática o renal disminuida. En pacientes ancianos podrá considerarse una reducción de la dosis.
- Uso con otros medicamentos: la administración simultánea con anticolinérgicos (sulfato de atropina, bromuro de butilescopolamina) puede disminuir la acción de Mosaprida citrato, por lo que se recomienda ampliar los intervalos de administración entre ambas medicaciones.

USO ADECUADO DE perivan®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome **perivan® tabletas** durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C. Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A. 

Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com

Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

