

# perivan plus®

MOSAPRIDA CITRATO  
DIMETILPOLISILOXANO

**regulador de la motilidad gastrointestinal,  
antiflatulento**

Suspensión oral gotas

## CONOCIENDO perivan plus®

**perivan plus® suspensión oral gotas** combina dos principios activos, Mosaprida citrato y Dimetilpolisiloxano. La Mosaprida citrato actúa estimulando la motilidad gástrica y esofágica, lo cual permite acelerar el vaciamiento gástrico y el alivio de la dispepsia no ulcerosa, gastroparesia y reflujo gastroesofágico. Por su parte, el Dimetilpolisiloxano produce el alivio de los síntomas producidos por exceso de gas en el estómago y el intestino.

## QUÉ CONTIENE perivan plus®

Cada 1 mL de **perivan plus® suspensión oral gotas** contiene: Mosaprida citrato dihidrato equivalente a

Mosaprida citrato	5 mg
Dimetilpolisiloxano	80 mg
Vehículo c.s.	

## EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO perivan plus®

**perivan plus® suspensión oral gotas** está indicado para el tratamiento de las siguientes molestias:

- Trastornos de la motilidad gastrointestinal
- Dispepsia no ulcerosa
- Reflujo gastroesofágico
- Gastroparesia (retraso del vaciamiento gástrico)
- Síntomas digestivos (ardor estomacal, náusea, vómito) que acompañan a la gastritis crónica
- Meteorismo (presencia de gas en el intestino)

## CÓMO SE PRESENTA perivan plus®

**perivan plus® suspensión oral gotas** se presenta en caja conteniendo un envase de 30 mL (1 mL = 26 gotas) con gotero dosificador integrado que provee el tamaño de gota adecuado para su correcta dosificación, y el presente inserto.

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para los distintos pacientes. Siga las instrucciones que le indique su médico. A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

**Adultos:** 1 mL (26 gotas) 3 veces al día, antes de las comidas. Agitar antes de usar.

**Ancianos:** 0.5 mL (13 gotas) 3 veces al día, antes de las comidas. Agitar antes de usar.

## ANTES DE USAR perivan plus® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** No administrar en pacientes alérgicos a alguno de los componentes. Infórmele a su médico si usted padece de alergia a cualquier otro medicamento o comida.
- **Embarazo y lactancia:** no administrar durante el embarazo y la lactancia.
- **Administrar con precaución en pacientes con función hepática o renal disminuida.** En ancianos podrá considerarse una reducción de la dosis.
- **Uso con otros medicamentos:** la administración simultánea con anticolinérgicos (sulfato de atropina, bromuro de butilescopolamina) puede disminuir la acción de Mosaprida citrato, por lo que se recomienda ampliar los intervalos de administración entre ambas medicaciones.

## USO ADECUADO DE perivan plus®

- No administre más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Administre este medicamento durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal.
- No duplique la dosis.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al  
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

