

principal®

FOSFOLÍPIDOS ESENCIALES Y
VITAMINAS HEPATOPROTECTORAS

Protector hepático

- Tabletas recubiertas
- Polvo para suspensión oral

CONOCIENDO principal®

principal® es un medicamento que activa el metabolismo del hígado, ya que los Fosfolípidos incluidos en su fórmula son una réplica de la estructura química de los ya presentes en el organismo, por lo que son mejor captados por el hígado y a la vez mejor incorporados en sus membranas y organelos para ser transmitidos a la bilis, la cual funciona como medio ideal de desintoxicación. Los Fosfolípidos contenidos en principal® favorecen la movilización de las grasas neutras acumuladas por alteraciones en las células hepáticas, con lo que previenen el desarrollo de cambios grasos degenerativos. Las Vitaminas del complejo "B", además de su acción en la movilización de grasas a concentraciones óptimas, contribuyen a un buen número de importantes transformaciones metabólicas, con lo que se logra un mejor funcionamiento del hígado a la vez que se protege la célula hepática.

QUÉ CONTIENE principal®

Cada tableta recubierta de principal® forte contiene:

Fosfolípidos esenciales (principales)	300 mg
Vitamina B1 (Tiamina HCl)	6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	6 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	6 mcg
Nicotinamida	30 mg
Vitamina E	6 mg
Excipientes c.s.	

Cada 5 mL de suspensión preparada principal® polvo contiene:

Fosfolípidos esenciales (principales)	150 mg
Vitamina B1 (Tiamina HCl)	6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	6 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	6 mcg
Nicotinamida	30 mg
Vitamina E	6 mg
Vehículo c.s.	

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO principal®

principal® está indicado como coadyuvante para el tratamiento hepático leve.

CÓMO SE PRESENTA principal®


principal® forte se presenta en caja conteniendo 25, 35, 60 y 75 tabletas recubiertas, dentro de burbujas individuales de blíster, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

principal® polvo para suspensión oral se presenta en caja conteniendo un frasco con polvo y un frasco con agua purificada en cantidad apropiada para preparar 120 mL de suspensión oral. Incluye vasito dosificador, instructivo de uso, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Sigla las indicaciones que le dé su médico. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

RECOMENDACIÓN DE USO	
Sigla las indicaciones que le dé su médico.	
	TABLETAS RECUBIERTAS Se recomienda administrar 2 tabletas recubiertas tres veces al día, después de cada comida, durante 3 meses.
	SUSPENSIÓN ORAL (PREPARADA) Se recomienda administrar de 5 mL a 10 mL de suspensión preparada después de cada comida, durante 3 meses.

ANTES DE USAR principal® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- **Alergia:** no administrar en personas alérgicas a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- **principal® forte tabletas recubiertas** contiene Tartrazina, no administrar a personas alérgicas a la Tartrazina.
- **principal®** no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada, ni de un estilo de vida saludable.
- Su administración en el embarazo y lactancia es segura, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de uso y no se sobrepase la dosis.

EFECTOS ADVERSOS

Al igual que con otros medicamentos, **príncipeal®** puede presentar efectos adversos tales como molestias gástricas ligeras después de ingerir.

En caso de que estos y otros efectos adversos inesperados se presenten, consulte a su médico.

USO ADECUADO DE **príncipeal®**

- No tomar más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si la próxima dosis está muy cercana, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.
- Para forma de preparación de la suspensión y administración, ver instructivo adjunto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Polvo antes de preparar la suspensión y tabletas recubiertas: protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Suspensión preparada: después de preparada la suspensión, almacenarla a temperatura ambiente y utilizarla en un período no mayor de 30 días, al cabo de ese tiempo desechar el sobrante.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE.



LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro
Departamento Médico en Guatemala al
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com