



# viridon®

TADALAFILO

## tratamiento para la disfunción eréctil

Tabletas

### CONOCIENDO viridon®

**viridon®** contiene como principio activo Tadalafilo, el cual es un inhibidor selectivo y potente de la Fosfodiesterasa Tipo 5, cuyo mecanismo de acción produce el aumento de la cantidad de GMPc (Guanosin monofosfato cíclico). Este efecto mejora la función eréctil a través de la relajación del músculo liso y el aumento del flujo sanguíneo en el cuerpo cavernoso, mediados por la mayor concentración de GMPc.

### QUÉ CONTIENE viridon®

Cada tableta de **viridon® 20 mg** contiene:  
Tadalafilo 20 mg  
Excipientes c.s.

### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO viridon®

**viridon® 20 mg tabletas** está indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil en hombres adultos y para el tratamiento de los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata (HBP).

### CÓMO SE PRESENTA viridon®

**viridon® 20 mg tabletas** se presenta en caja con 4 tabletas contenidas en burbujas individuales de blister, que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes. Siga las instrucciones que le dé su médico. A continuación se presenta la dosis promedio usual:

#### Adultos

La dosis recomendada es de 20 mg con o sin alimentos cuando se requiera. Tomar 30 minutos antes de la actividad sexual, basado en la eficacia y tolerabilidad individual. Después de la administración se mejora la función eréctil hasta por 36 horas.

No tomar **viridon®** más de una vez al día y no se recomienda su uso diario continuo.

### ANTES DE USAR viridon® LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Su uso debe ser bajo estricta vigilancia médica.
- Alergia: infórmele a su médico si usted padece de alergia a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otro medicamento o comida.
- No es apto para mujeres, hombres que no padezcan de disfunción eréctil, en diabéticos e hipertensos con cardiopatía.
- El médico debe establecer el estado cardiovascular del paciente y el grado de riesgo cardiaco asociado a la actividad sexual, para definir si puede o no tomar **viridon®**.
- Consulte con su médico antes de tomar **viridon®** si usted padece de: anemia falciforme (anormalidad de los glóbulos rojos), mieloma múltiple (cáncer de la médula ósea), leucemia (cáncer de las células sanguíneas) o cualquier deformación del pene.
- Si al tomar **viridon®** se produce una erección por más de 4 horas, se debe buscar atención médica de emergencia.
- Suspender el uso de **viridon®** y buscar ayuda médica en caso de pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos, y en caso de disminución o pérdida de la audición.
- Se debe tener precaución si se utiliza **viridon®** con alfa-bloqueadores, antihipertensivos o cantidades sustanciales de alcohol, ya que pueden producir hipotensión.
- En caso de daño hepático leve o moderado el médico debe ajustar la dosis. En daño hepático severo no se recomienda el uso de **viridon®**.
- En caso de daño renal con depuración de creatinina de 30-50 mL/min la dosis no debe exceder a 5 mg cada 72 horas.
- Infórmele a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
- Debido a que algunos pacientes presentan mareos al tomar este tipo de medicamento, deberá tener la precaución de ver cómo puede afectarle el tratamiento antes de conducir o utilizar máquinas.
- Utilizar con precaución en pacientes geriátricos, por la alta sensibilidad en este grupo de pacientes.
- Se debe tener precaución al tomar cuando se esté utilizando inhibidores potentes del CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol y eritromicina) ya que se ha observado que su administración simultánea aumenta la exposición a Tadalafilo.

## CONTRAINDICACIONES

**viridon**® como otros medicamentos que contienen Tadalafilo está contraindicado en pacientes con las siguientes condiciones:

- Hipersensibilidad al Tadalafilo o a los componentes de la fórmula.
- No utilizar si está tomando cualquier tipo de nitratos orgánicos o donadores de óxido nítrico como el nitrito de amilo.
- No administrar con estimuladores de la guanilato ciclasa, como el riociguat.
- Si padece una enfermedad grave del corazón o ha sufrido recientemente un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, si tiene daño hepático severo, o tensión arterial baja o alta no controlada.
- Si ha presentado anteriormente pérdida de visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), descrita también como “infarto del ojo”.

## INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

- El Tadalafilo potencia el efecto hipotensor de los nitratos.
- El Tadalafilo se metaboliza principalmente en el citocromo CYP3A4, cuando se administran inhibidores de este último, como el ketoconazol, se aumenta la exposición del Tadalafilo; y al administrar con inductores de este citocromo, como la rifampicina, se produce una disminución de la eficacia del Tadalafilo; otros inductores del citocromo CYP3A4 son fenobarbital, fenitoína y carbamazepina.
- Inhibidores de la Proteasa como, el ritonavir, incrementan la exposición del Tadalafilo.
- Los antiácidos provocan una reducción de la absorción del Tadalafilo.

## EFFECTOS ADVERSOS

A continuación se detallan las reacciones adversas más frecuentes:

- Dolor de cabeza
- Indigestión o acidez estomacal
- Náuseas
- Mareo
- Rubor
- Congestión nasal
- Dolor en estómago, espalda, músculos, brazos o piernas

## USO ADECUADO DE viridon®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Sólo su médico puede indicarle que baje o suba la dosis del medicamento, dependiendo cómo reacciona su cuerpo y de su condición de salud.
- No tome **viridon**® más de una vez al día.
- No utilice **viridon**® en conjunto con otros medicamentos destinados para el tratamiento de la disfunción eréctil.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
A.G.S.A.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)

0030621

COD. 53140

