

# donosartán amlo®

CANDESARTÁN CILEXETILO  
AMLODIPINA

## antihipertensivo

- donosartán amlo® 16 mg /2.5 mg tabletas
- donosartán amlo® 16 mg /5 mg tabletas

### CONOCIENDO donosartán amlo®

donosartán amlo® tabletas contiene como principios activos Candesartán cilexetilo un ARA-II selectivo para los receptores AT1, a los que se une fuertemente y de los que se disocia lentamente. Y Amlodipina un inhibidor de la entrada de iones de calcio del grupo dihidropiridina (bloqueante de canales lentos o antagonista de los iones calcio), que inhibe la entrada transmembrana de iones de calcio en el músculo cardíaco y en el músculo liso vascular.

### QUÉ CONTIENE donosartán amlo®

#### donosartán amlo® 16 mg/2.5 mg tabletas

Cada tableta contiene:  
Candesartan cilexetilo 16 mg  
Amlodipina (como besilato) 2.5 mg  
Excipientes c.s.

#### donosartán amlo® 16 mg/5 mg tabletas

Cada tableta contiene:  
Candesartan cilexetilo 16 mg  
Amlodipina (como besilato) 5 mg  
Excipientes c.s.

### EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donosartán amlo®

donosartán amlo® tabletas está indicado como terapia sustitutiva en pacientes con hipertensión esencial cuya presión arterial ya es controlada adecuadamente con Candesartan cilexetilo y Amlodipina administrados concomitantemente por separado, pero al mismo nivel de dosis. Además, está indicado en aquellos pacientes cuya presión arterial no ha sido debidamente compensada en monoterapia y es necesario escalar el tratamiento a terapia dual.

### CÓMO SE PRESENTA donosartán amlo®

donosartán amlo® 16 mg/2.5 mg tabletas se presenta en caja con 5 y 30 tabletas contenidas en burbujas individuales de blíster de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

donosartán amlo® 16 mg/5 mg tabletas se presenta en caja con 5 y 30 tabletas contenidas en burbujas individuales de blíster de aluminio/aluminio que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para cada paciente. Siga las indicaciones que le de su médico. Antes de utilizar donosartán amlo®, los pacientes deben estar controlados a dosis estables de monoterapia tomadas al mismo tiempo. La dosis de donosartán amlo® tabletas debe basarse en la dosis de los componentes en terapia individual al momento de cambiar a la combinación. A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos: una tableta al día, con o sin comida.

### ADVERTENCIAS

- Cuando se administra Candesartán a pacientes hipertensos con insuficiencia renal, se recomienda la realización de controles periódicos de los niveles de potasio sérico y de creatinina.

### PRECAUCIONES

- Candesartán y Amlodipina no son dializables.
- Si fuera necesario la administración dual de inhibidores de la ECA con Candesartán solo se debe llevar a cabo bajo la supervisión de un especialista y sujeta a una monitorización estrecha y frecuente de la función renal, los niveles de electrolitos y presión arterial.
- La evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca debe incluir controles periódicos de la función renal, especialmente en ancianos a partir de 75 años y pacientes con función renal alterada.
- Durante la diálisis la presión arterial puede ser especialmente sensible al bloqueo de los receptores AT1, como resultado de la reducción del volumen plasmático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto debe ajustarse cuidadosamente la dosis de Candesartán mediante una monitorización minuciosa de la presión arterial en pacientes sometidos a hemodiálisis.

### CONTRAINDICACIONES

- No administrar en caso de hipersensibilidad a Candesartan cilexetilo o Amlodipina, o cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Contraindicado en el segundo y tercer trimestres del embarazo.
- donosartán amlo® tabletas esta contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave y/o colestasis.
- La seguridad y eficacia en niños menores de 18 años no se ha establecido, por lo que no se recomienda su administración.
- Contraindicado en pacientes con hipotensión grave, shock (incluyendo shock cardiogénico), obstrucción del conducto de salida del ventrículo izquierdo, en insuficiencia cardíaca hemodinámicamente inestable tras infarto agudo de miocardio.

## INTERACCIONES

- La administración con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos como la heparina, pueden incrementar los niveles de potasio. Se debe monitorear los niveles de potasio cuando se considere apropiado.
- La administración de Candesartán con litio, aumenta las concentraciones séricas de litio y por lo tanto su toxicidad.
- La administración de Amlodipino y Claritromicina puede aumentar el riesgo de hipotensión, se recomienda una observación minuciosa de los pacientes.

## EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros medicamentos **donosartán amlo**® tabletas, puede provocar efectos adversos tales como: Infecciones respiratorias, mareos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, trastornos visuales (incluyendo diplopía), palpitaciones, sofocos, disnea, dolor abdominal, dispepsia, cambio del hábito intestinal (incluyendo estreñimiento), náuseas, diarrea, hinchazón de tobillo, calambres musculares, fatiga y astenia.

## USO ADECUADO donosartán amlo®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome este medicamento durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como sea posible; sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30 °C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.



LABORATORIO Y DROGUERÍA  
**DONOVAN WERKE**  
**A.G.S.A.**



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro  
Departamento Médico en Guatemala al  
PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a [info@donovanwerke.com](mailto:info@donovanwerke.com)  
Le invitamos a visitar nuestra página web: [www.donovanwerke.com](http://www.donovanwerke.com)